

外臺秘要

H

Chinese

Vol. II

V2-V4 2

尚德按八
疑當作七

尚德按今
有方一十
一首
尚德按今
有方八首

唐王素先生外臺秘要方卷二目錄傷寒下二

傷寒中風方九首

傷寒嘔噦方一十四首

傷寒吐衄血及下血方三首

傷寒煩渴方九首

傷寒春冬欬嗽方三首

傷寒口瘡方二首

傷寒虛羸方四首

傷寒小便不利方九首

傷寒蟲瘡方一十首

傷寒勞復食復方二十五首

傷寒狐惑病方四首

傷寒結胸方七首

傷寒喉咽痛方八首

傷寒衄血方四首

傷寒癰實及宿食不消方二首

傷寒攻目生瘡兼赤白翳方六首

傷寒手足欲脫疼痛方八首

傷寒不得眠方四首

傷寒下痢及膿血黃赤方一十六首

傷寒陰陽易方八首

傷寒百合病方七首

唐王壽先生外臺祕要方卷二

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等上進

奉政大夫同知徽州府事兩陽許個一彥父校

新安後學程衍道敬通父訂梓

尚德按傷寒論固并傷寒中風而論之傷寒蓋未達其旨耳

傷寒中風方九首臣億等按傷寒論傷寒中風自是兩疾今云傷寒中風非病源中風傷寒之狀太陽中風陽浮陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出香香惡寒漸漸惡風翕翕發熱

鼻鳴乾嘔此其候也

太陽中風以火刻發其汗邪風被火熱血氣流溢失其常度兩陽相熏灼其身即發黃陽盛則欲飲陰虛

小便難陰陽俱虛竭身體則枯燥但頭汗出刺頭而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則譫語荒語也本作譫

甚者至噦手足躁擾循衣摸牀小便利者其人可療

陽明中風口苦而咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮緊若下之則腹滿小便難

陽明病若能食為中風不能食為中寒

少陽中風兩耳無所聞目赤胃中滿而煩者不可吐下吐下之則悸而驚

太陰中風四肢煩疼其脈陽微陰澀而長者為欲愈

少陰中風其脈陽微陰浮者為欲愈

厥陰中風其脈微浮者為欲愈不浮為未愈仲景傷寒論同並出第七卷中

仲景傷寒論桂枝湯療太陽中風陽浮陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出香香惡寒漸漸惡風翕翕發

熱鼻鳴乾嘔方桂枝芍藥生薑各三兩甘草二兩大棗十二枚右五味切薑棗棗次切餘藥以水七

升煎棗令爛去滓乃內諸藥水少者益之煮令微微沸得三升去滓服一升日三小兒以意減之初一

服便得汗出者後服小小潤其間如不得汗者小小促之令其藥勢相及汗出自護如服六物青散法

尚德按方後文與傷寒論異

尚德按分註證疑當作譫

通按傷寒
本文反汗
出惡風者
無不字
通按傷寒
論麻黃三
兩餘同

尚德按千
金桔葉十
兩大棗十
二枚煮取
五升無更
煎取三升
五字

若病重者晝夜服特須避風若服一劑時不解病證不變者當更服之至有不肯汗出服二三劑乃愈服此藥食頃亦當飲熱粥以助藥力若初得病甚便以火發汗火氣太過汗出不解煩躁不得寐因此湯加龍骨牡蠣各三兩減桂心生薑各一兩不用芍藥若虛勞裏急腹中痛者取前桂枝湯二升加膠飴一升適寒溫分再服若得大汗出者只用桂枝二兩發汗後重發汗亡陽譫語其脈反和者不死發汗已解半日許重發煩其脈浮數可復發汗宜桂枝湯方忌海藻松菜生葱等在上出第二卷中干金匱治集驗文仲備

又療傷寒頭疼腰痛身體骨節疼發熱惡風汗不出而喘麻黃湯方 麻黃三兩桂心二兩甘草二兩杏仁五十枚去皮共兩仁碎 右四味切以水九升煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升半去滓服八合覆取微汗不須散粥餘如桂枝法將息忌海藻松菜生葱臣億等按振仲景論麻黃湯惟主傷寒不主中風若中風但可服前桂枝湯

又療太陽病項背強八八反汗不出惡風者屬葛根湯方 葛根兩麻黃四兩甘草二兩芍藥二兩桂心二兩生薑三兩大棗十二枚 右七味切以水一斗煮麻黃葛根減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗出不須喫熱粥助藥發汗餘將息依桂枝法忌海藻松菜生葱並出第三卷中張仲景傷寒論治中風汗

小品萎蕤湯療冬溫及春月中風傷寒則發熱頭眩痛喉咽乾古強胸內疼心胸痞結滿腰背強方 萎蕤二兩石膏三分末白微麻黃二兩獨活二兩杏仁二兩去皮芍藥甘草二兩青木香二兩無可用磨菜並出第六卷中古今錄

右九味切以水八升煮取三升分三服取汗若一寒一熱者加朴硝一分及大黃三兩下之忌海藻松菜並出第六卷中古今錄

千金療傷寒中風五六日已上但胸中煩乾嘔枯蕤實湯方 枯蕤實兩柴胡半斤黃芩三兩生薑四兩大棗十枚 右六味切之勿令大碎吹去末以水一斗二升煮得六升絞去滓更煎取三升適寒溫服一升日三服忌海藻松菜並出第十卷中

溫服一升日三服忌海藻松菜並出第十卷中

尚德按千金翼錄一兩六銖半傷寒論

尚德按千金翼錄三兩傷寒論同

尚德按十金無黃芩即桂枝湯

尚德按傷寒論無此語

尚德按今有十四法

通按不胎本是胎滑

千金翼療中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水飲水而吐此為水逆五苓散主之方 豬苓

紅澤瀉五苓散桂枝心白木

右五味搗篩水服方寸匕日三多飲暖水汗出愈忌桃李醋物生

蔥雀肉等

人傷寒中風醫反下之其人下利日數十行水穀不化腹中雷鳴心下痞堅而滿乾嘔心煩不能得安醫

見心下痞以為病不盡復重下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使之堅甘草瀉心湯主之方 甘草四兩黃芩三兩大棗十二枚黃連二兩乾薑二兩半夏半升洗 右六味切以水一斗煮取六升分六

服忌海藻菰菜猪羊肉錫方有人參三兩中

古今錄驗療中風傷寒脈浮發熱往來汗出惡風項頸強鼻鳴乾嘔陽旦湯主之方 大棗十二枚桂枝三

芍藥三兩生薑三兩甘草二兩黃芩二兩

右六味以咀以泉水六升煮取四升分四服日三自汗者去桂心

加附子一枚炮渴者去桂加栝蒌三兩利者去芍藥桂加乾薑三兩附子一枚炮心下悸者去芍藥加

茯苓四兩虛勞裏急者正陽旦主之煎得二升內膠飴半升分為再服若脈浮發熱者不可與也忌

海藻菰菜生蔥等物千金

又大青龍湯療太陽中風脈浮發熱惡寒身疼痛汗不出而煩躁方 麻黃去節桂枝二兩甘草二兩石

膏麻黃子大生薑三兩杏仁四枚去皮去雨大棗十二枚 右七味切以水九升先煮麻黃減二升去滓乃內

諸藥煮取三升去滓分服一升厚覆取微汗汗出多者溫粉粉之一服汗者不可再服若復服汗多亡

陽遂虛惡風煩躁不得眠也忌海藻菰菜生蔥等物並出第二卷中張仲景傷寒論

傷寒結胸方七首一法十

病源結胸者謂熱毒氣結聚於心胸也此由病發於陽而早下之熱氣乘虛而痞結不散也按之痛其脈

寸口浮關上反自沉是也脈大不可下下之則死脈浮而大下之為逆若陽脈浮關上細小沉緊而飲食

如故時小便利者名為藏結藏結病舌上白胎滑者為難療不往來寒熱其人反靜舌上白胎者不可攻

之出第七

張仲景傷寒論問曰病有結胸有藏結其狀如何答曰按之痛寸脈浮關脈沉名結胸也問曰何謂藏結答曰如結胸狀飲食如故時時下利寸口脈浮關上小細而沉緊名藏結舌上白胎滑者為難治藏結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之一作因作痞也所以成結胸者以下之太早故也

結胸證悉具煩躁者亦死

結胸證其脈浮大者不可下也下之則死

夫結胸病項亦強如柔瘕狀下之則和宜大陷胸丸方

辨

右四味搗篩二味杏仁含芒硝研如泥和散合和丸如彈子大每服一丸用甘遂末一錢匕白蜜

一兩水二升同煮取一升溫頓服之一宿乃自下如不下更服取下為效

又太陽病脈浮動數浮則為風數則為熱動則為痛數則為虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒表未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛痛即眩胃中空虛客熱動膈短氣煩躁心內懊憹陽氣內陷心下因堅則

為結胸大陷胸湯主之

若不結胸但頭汗出餘處無汗劑頸而還小便不利身必發黃大陷胸湯方 蜀大黃兩六分甘遂末一錢芒

硝升

右三味以水六升先煮大黃取二升去滓內芒硝煮一兩沸內甘遂末溫服一升得快利止後

服

又傷寒六七日結胸熱實脈沉緊心下痛按之石堅大陷胸湯主之方依前法

但結胸無大熱者此水結在胸膈也但頭微汗出者大陷胸湯主之方依前法

又傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯

大柴胡湯方

柴胡半斤枳實四枚生薑五兩黃芩二兩芍藥三兩半夏半升大棗十二枚

右七味切以水一斗二

尚德按此傷寒論次與傷寒論不同文理積欠順作二合尚德按一雨傷寒論作客氣

尚德按去
滓下傷寒
論有再煮
取三升五
字

尚德按却
傷寒論作
被刺

尚德按方
寸傷寒論
作錢

尚德按更
字上傷寒
論有內巴
豆三字

升煮取六升去滓更煎取三升溫服一升日三服一方加大黃二兩若不大黃恐不名為大柴胡湯

又太陽病二三日不能卧但欲起心下必結脉微弱者本有久寒也而反下之若利止者必作結胸未止者四日復下之此作協熱利也

又太陽病下之其脉促不結胸者此為欲解也若心下滿鞭痛者此為結胸也大陷胸湯主之但滿而不痛者此為痞柴胡不中與之也宜半夏瀉心湯主之方 半夏瀉心湯 乾薑 人參 甘草 黃連 兩

大棗 枚 半 黃芩 兩 右七味切以水一斗煮取六升去滓溫服一升日三若須大陷胸湯服者如前法忌羊肉錫海藻菜豬肉冷水等并穀類五兩

又小結胸病正在心下按之則痛脉浮滑者小陷胸湯主之方 黃連 一兩 枳實 一兩 半夏 半升 右三味切以水六升煮枳實取三升去滓內諸藥煮取二升去滓溫分三服忌羊肉錫豬肉

又病在太陽應以汗解之反以冷水瀉之若灌之其熱却不得去彌更益煩皮上粟起意欲飲水而反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散用前篇方 文蛤散 文蛤 五兩 右一味搗篩為散以沸湯和一方寸匕

又寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯方如前法白散亦可服 文蛤散 文蛤 五兩 右一味搗篩為散以沸湯和一方寸匕

又白散方 桔梗 貝母 各三分 巴豆 一分 右三味搗篩更於臼內搗之以白飲和服強人

半錢匕贏人減之病在膈上則吐在膈下則利利不止飲冷粥一杯止忌豬肉蘆葦等 傷寒嘔噦方一十四首

乃動故使心下堅牢噦噦食臭腹內雷鳴而泄利此由脾胃虛冷故也 傷寒嘔噦方一十四首

傷寒嘔噦方一十四首

由糖換上安
略心字
有微字
無奈半斤
一作半斤
二升作取
作二升
高接小
冷服要
作溫服

仲景傷寒論嘔噦心下悸痞鞭不能食小半夏湯方 半夏洗一升生薑八兩 右二味切以水七升煮

取一升半去滓分再服忌羊肉錫

又療嘔噦心下痞鞭者以膈間有水頭眩溲半夏加茯苓湯方 半夏洗一升生薑八兩茯苓三 右三味

切以水七升煮取一升半去滓溫分再服忌羊肉錫酖等物

又療胸內似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦心中憤憤然徹無聊賴者生薑汁半夏湯兼主天行方 生薑

升一半夏洗半升 右二味以水三升煎半夏取一升內薑汁取一升半綿漉小冷分二服一日一夜服

令盡嘔噦一服得止者停後服忌羊肉錫同急

又療乾嘔噦若手足厥冷者小橘皮湯兼主天行方 橘皮四兩生薑八兩 右二味狹長切以水七升煮

取三升去滓小冷服一升下咽則愈救急同出第

深師療傷寒病嘔不止甘草湯方兼主天行 甘草三兩 橘皮三兩 右二味切以水五升煮取一升去

滓頓服之日三四服取差忌海藻菰菜同氏

又半夏散方 半夏洗 右一味末之生薑湯和服一錢匕忌羊肉錫等

又赤蘇湯方 赤蘇把 右一味水三升煮取一升去滓稍稍飲之同後

又乾薑丸方 乾薑鈇附子四分 右二味搗篩以苦酒丸如梧子服三九日三服酒飲下皆得忌豬肉

付復

又療傷寒嘔噦甘竹茹湯方 甘竹茹四兩生白米升 右二味以水八升煮之取米熟湯成去滓分服徐徐

服療風熱氣噦甚神驗諸噦亦佳

又療傷寒嘔噦胸滿虛煩不安大橘皮湯方 橘皮一斤甘草一斤生薑四兩人參二兩 右四味切以水六升

煮取二升去滓分三服忌海藻菰菜並出第十

小品茅根橘皮湯療春夏天行傷寒胃冷變嘔方 白茅根切一 橘皮三兩桂心二兩 右三味切以水六

升貴取三升去滓溫分三服數服之盡復合之宛止乃停取微汗有熱減桂心一兩忌生葱出仲同

千金療傷寒後嘔噦及乾嘔不下食生蘆根飲方 生蘆根切一升 青竹茹一升 粳米三升 右四味

以水七升先煮千里雞底一隻取五升澄清下藥煮取二升半去滓隨意使飲不差重作

大瘧傷寒後嘔噦通草湯方 通草三兩 生蘆根切一升 橘皮一升 粳米三升 右四味切以水五升煮取二升去

滓隨意使稍飲不差更作取差止古今錄驗文仲

千金翼乾嘔吐涎沫而頭痛茱萸湯主之方 吳茱萸一升 大棗十二枚 生薑六兩 人參三兩 右四味以

水五升煮取二升去滓分服七合日三仲景同出第十卷中

傷寒咽喉痛方八首

傷寒傷寒病過經而不愈脈反沉遲手足厥逆者此為下部脈不至陰陽隔絕邪客於足少陰之經毒氣

上重故咽喉不利或痛而生瘡出第七

仲景傷寒論少陰病咽喉痛者半夏散及湯主之方 半夏洗 甘草炙 桂心 右三味等分各搗篩畢更

合搗之以白飲服方寸匕日三服若不能服散者水一升煮七沸內散兩匕更煮三沸下火令小冷少

少含如噦之半夏有毒不當散服之忌羊肉生薑海藻菘菜鰓千金翼同出

文仲療傷寒毒攻喉咽腫痛方東主天行 切商陸炙令熱以布藉喉以漿布上冷復易之附後

又方 真蘇合瓜甲大口中以升小噲汁以清喉當微覺異為佳亦主天行附後

又附子丸方 附子七枚 藜蘆分 右二味末之蜜和丸服如梧子一枚飲下含黃柏亦佳忌豬肉鯉肉出

宋師聖喉痛傷寒古強喉痛方 蜜一升 甘草四兩 豬膏半斤 右三味微火煎甘草豬膏令數沸去滓乃內

蜜溫令銷相得如棗大含化稍稍咽之忌海藻菘菜出第十

傷寒咽喉痛方八首

集驗唐傷寒熱病喉中痛閉塞不通烏扇膏方 生烏扇一斤 豬脂一斤 右二味合煎烏扇藥成去滓取

如半雞子薄綿裏之內口中稍稍咽之取差忌酒蒜等物張文仲云

人升麻湯方 升麻二通草四升 干姜二兩 羊角三兩 為藥三兩 生薑根升切 右六味切以水七升煮取二

升半去滓分為三服徐徐服千金古今醫驗同

千金治傷寒熱病飯口乾多唾咽痛乾棗丸方 乾棗二十 烏梅十枚 右二味搗合蜜和丸如杏核大

裏含化嚥津自愈出第十卷中

傷寒吐唾血及下血方三首

病源此由諸陽受邪熱初在表應發汗而汗不發致使熱毒入深結於五臟內有瘀積故吐血出第八

仲景傷寒論吐血不止者柏葉湯主之方 青柏葉三兩 乾薑二兩 艾三把 右三味以水五升煮取一升去

滓別絞取新出馬通汁一升相和合煎取一升綿濾之溫分再服馬通是馬屎汁也一方有阿膠

又吐血下血黃土湯主之方 釜竈下黃焦土半升 甘草三兩 乾地黄三兩 白朮三兩 附子三兩 阿膠二兩 黃

芩三兩 右七味切以水八升煮六味取二升去滓內膠令烊分三服忌海藻菰菜薤菜豬肉桃李雀肉

等物出第十卷中

古今錄驗蒲黃湯療傷寒溫病天行疫毒及酒客熱傷中吐血不止面黃乾嘔心煩方 蒲黃 桑寄生

桔梗一作犀角 升麻各二兩 葛根三兩 右六味切以水七升煮取三升去滓分三服徐徐服之忌海藻

菰菜豬肉出第三卷中

傷寒吐血方四首

病源傷寒病吐血者此由五臟熱結所為也心主血肝藏血熱邪傷於心肝故吐血也吐血者鼻出血也肺

主氣而開竅於鼻血隨氣行所以從鼻出陽明病口燥但欲漱水不欲咽者此必吐血不可攻其表汗

出滿上脉急而緊直視而不能眈不得眠亡血不可攻其表汗出則寒慄而脈浮發熱其身無汗自

向德樓要 略乾薑三 又按通字 下疑脫汁 高樓按桑 略半升作 半斤二升 作三升

肘後療傷寒大病差後小方便血如狂者散及丸方 左關壯陽丸 石膏五 右二味博米酒服方寸

匕日三四亦可蜜丸如梧子大酒服十五丸 出集驗方卷中

小品為藥地黃湯療傷寒及諸病應發汗而不發之內瘕有血者及血吐血不盡內餘瘀血而黃大

便黑者此主消化瘀血 為藥地黃湯丹皮一兩犀角屑一 右四味切以水一斗煮取四升去滓溫服

一升日二三服有熱如狂者加黃芩二兩其人脈大來遲腹不滿自言滿者為無熱不用黃芩

又茅花湯 療傷寒鼻衄不止主之方 茅花一大 右以水八升煮取三升分三服即差若無茅花取

茅根代之亦可

又麥門冬湯 療傷寒身熱衄血嘔逆主之方 麥門冬 石膏 寒水石 各三兩 甘草 二兩 桂心 一兩 右五

味切以水一斗煮取三升分三服

傷寒煩渴方九首

病源此由陰氣少陽氣勝故熱而煩滿也少陰病惡寒而躁時自煩欲去其衣被者可治也病脈已解而

反發煩者病新差又強與穀脾胃氣尚弱不能消穀故令微煩損穀即愈少陰病脈微細而沉但欲卧汗

出不煩欲自吐五六日自利後煩躁不得卧寐者死發汗後下之脈平而少煩此新虛不勝穀氣故也又

傷寒渴者由熱氣入於藏流於少陰之經少陰主腎腎惡燥故渴而引飲 出傷寒論卷中

仲景傷寒論療傷寒汗出惡寒身熱大渴不止欲飲水一二斗者白虎加人參湯主之方 知母 六兩 石膏

粳米 各一升 人參 三兩 甘草 二兩 右五味切以水一斗二升煮米熟去米內諸藥煮取六升去滓溫服一升

日三忌海藻按菜 出第十卷 中品同 右五味切以水一斗二升煮米熟去米內諸藥煮取六升去滓溫服一升

又若脈浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之方 猪苓 去一兩 茯苓 一兩 阿膠 一兩 滑石 一兩 澤瀉 一兩

右五味以水四升先煮四物取二升去滓內阿膠令烊鍋溫服七合日三服忌醋物 出傷寒論卷中

尚德按傷寒論石藥一斤梗米六合

尚德按血字下疑脫方字

尚德按千金
金梔子仁
黃連各三
兩食字下
有後字

小按此即
通柴胡湯

范汪枯骨湯主渴飲方

括裏狼青三兩

右一味切

升者取一升分二服先以青波竹瀝一

升合水二升煮好銀

兩減半去銀先與

人飲之訖須臾後乃服梧葉汁其銀子燭令服

千金療傷寒

結熱在內煩渴香薷子丸方

青箱子 龍膽 黃芩 兩 梔子 仁 兩 黃柏 兩 枯蘆 兩 治火

深師黃荅人

湯療傷寒吐下後內外有執

渴不安方 黃芩 人參 甘草 桂心 生薑 附子 二大

棗
十五枚

右六味切以水八升煮取三

分三服徐徐

松葉海藻生蔓壽物

大療傷寒陰

止渴飲水枯莖根湯方

參

大黃 兩一 柏葉 根二 芒硝 甘草 二

右七

切以水八升煮取三升去滓

升福與臺

下後飲一升得下止勿復飲湯藥勢力

踞乃可食

一方生薑二兩忌海味

生薑汁

卷五

又療傷寒丁

合登合弗得四合

夢月冬心五

第十

宿食又感於傷寒熱氣相搏故宿食不消也

卷第八

深師鼓九瘕傷寒留飲宿食不消一名續命丸方 黃芩 大黃 路五 梔子仁 枳 六 黃連 五 豉 一 升

甘遂 三兩 大 麻黃 五兩 芒硝 二兩 已豆 一百枚 去皮 及心 右九味搗篩白蜜和丸如梧子服三丸以吐下為

度若不吐利加二九一本有杏仁七十枚忌豬肉冷水蘆薈肉 中 出第十四卷

古今錄驗續命丸療傷寒及癰疽瘰癧飲百病方 大黃 五兩 黃連 五兩 麻黃 五兩 甘遂 三兩 黃芩 二兩 芒硝 二兩

杏仁 七十枚 已豆 一百枚 去皮 及心 右九味搗篩蜜和丸得傷寒一日服一九如小梧子大二日

二九至六七曰六九但吐下得汗愈若水瀉及度食服三五九日二忌豬肉冷水蘆薈 范汪延年 同出第三

中

傷寒春冬欬嗽方三首

病源此由邪熱客於肺也上焦有熱其人必飲水水停心下則肺為之浮肺主於欬水氣乘之故欬嗽也

中

小品射干湯主春冬傷寒秋夏中冷咳嗽曲拘不得氣息喉鳴啞失聲乾欬無唾喉中如哽者方 射干

雨 二半 夏 五兩 杏仁 二兩 去皮 乾薑 二兩 甘草 二兩 紫苑 二兩 肉桂 二兩 吳茱萸 二兩 當歸 二兩 橘皮 二兩 麻黃 二兩

獨治雨 右十二味切以水一斗煮取三升去滓溫分三服始病一二日者可服此湯汗後重服勿汗

也病久者初服可用大黃二兩初秋夏月暴雨冷及天行暴寒熱伏於內宜生薑四兩代乾薑除茱萸

用枳實二兩炙忌羊肉海藻松菜鰾生蔥 卷中 出第六

古今錄驗下氣橘皮湯療春冬傷寒秋夏冷濕欬嗽喉中鳴聲上氣不得下頭痛方 橘皮 紫苑 麻

黃 蘇杏仁 去皮 當歸 桂枝 甘草 炙 黃芩 各三 右八味切以水七升煮取三升分三服不差

重合之忌海藻松菜生蔥 卷中 出第三

延年療傷寒骨節疼頭痛眼睛疼欬嗽知母湯方 知母 二兩 貝母 乾薑 芍藥 各三 石膏 四兩 黃芩 三

外臺秘要卷二

傷寒攻目生瘡兼赤白腎方六首

杏仁一兩去皮 梔子仁 右八味切以水七升煮取二升五合去滓分為三服如人行八九里再

服忌蒜麴七日卷中九

傷寒攻目生瘡兼赤白腎方六首

病源曰者藏腑之精華肝之外候也傷寒熱毒壅滯重蒸於肝上攻於目則令目赤腫痛若毒氣成者眼

生翳膜入肝開竅於目肝氣虛熱乘虛上衝於目故目赤痛重者生瘡翳白膜息肉卷中八

肘後療傷寒大病後熱毒攻目方 煮蜂房以洗之日六七度

又方 冷水漬青布以掩目

人瘡熱病後生翳方 燒豉二七粒末內管中以吹之並出第二卷中

小品漏蘆連翹湯療傷寒熱毒變作赤色癰疽丹癰腫毒及眼赤痛生障翳慈主之方兼療天行 漏蘆

連翹 黃芩 麻黃 白斂 升麻 甘草 右九味切以水九升煮取三

升去滓溫分三服相去二食頃更服熱盛者可加芒硝二兩忌海藻菘菜等物肝全

又秦皮湯療毒病衝眼忽生赤翳或白或腫膚起或赤痛不得視光痛入心肝或眼外浮腫如吹汁出生

膜覆珠子方 秦皮 前胡 常山 黃芩 升麻 芍藥 白薇 枳實 大黃 甘草 右十味以水八升煮取三升分三服相去二食頃更服若盛熱者可加芒硝二兩忌海藻菘菜生薑生

菜並出第六卷中 仁一兩 枳實二兩 大黃三兩 甘草二兩

張文仲秦皮湯主傷寒病熱毒氣入眼生赤脉赤膜白膚白翳者及赤痛不得見光痛毒煩慙者神效方

秦皮 升麻 黃連 右三味切以水洗去塵用水四升煮取二升半冷之分用三合仰眼以綿

繞筋頭取湯以滴眼中如屋漏狀盡三合止須臾復用日五六遍乃佳忌豬肉冷水卷中二

傷寒口瘡方二首

病源夫傷寒冬時發其汗必吐利口中爛生瘡以其熱毒在藏心脾煩壅表裏俱熱熱不已毒氣熏於上

佳故令口舌乾燥生瘡也出第七卷中

深師療傷寒熱病口瘡黃柏蜜方黃柏剉碎上水煎取右一味以崖蜜半斤極消者以漬柏一宿唯

欲令濃含其汁良久吐之復如前若胸中熱有瘡時飲三五合尤良

又療傷寒口瘡爛者升麻湯方升麻一斤甘草二兩竹葉切五麥門冬三分壯丹一分乾棗二十右六味

切以水四升煮取一升半去滓分五服含稍稍咽之為度忌海藻菰菜胡荽等出第十卷中

傷寒手足欲脫疼痛方七首

病源此由熱毒氣從內而出循經路攻於手足也人五藏六腑并榮俞皆出於手足指故毒從臟腑而出

也出第八卷中

范汪療傷寒熱病手足腫欲脫方生牛肉裹之腫消痛止出第三十卷中

崔氏療傷寒手足熱痠欲脫方取羊屎煮汁以淋之差止亦療時疾陰囊及虛腫亦可煮黃柏洗之出第三十卷中

集驗療毒熱攻手足腫疼欲脫方濃煮虎杖根適寒溫以漬手足入至踝上一尺出第三十卷中

又方酒煮苦參以漬之出第三十卷中

千金療毒熱病攻手足腫疼痛欲脫方煮馬糞若羊糞汁漬之出第三十卷中

又方取常思草絞取汁以漬之出第三十卷中

備急療熱病手足腫欲脫者方兼主天行以稻稬反汁漬之佳出第三十卷中

傷寒虛藏方四首

病源其人血氣先虛復為虛邪所中發汗吐下之後經絡俱損傷陰陽竭絕邪始散真氣尚少五藏猶

虛穀神未復無津液以榮養故虛藏而生病焉出第八卷中

集驗療傷寒虛藏少氣氣逆苦嘔吐方石膏一斤碎竹葉一握麥門冬六分人參二兩半夏一升生薑四兩

高德按千金云煮馬屎與手裏汗漬之正三度

傷寒手足欲脫疼痛方七首 傷寒虛藏方四首

草二兩 石七味切以水一斗二升煮取六升去滓內梗米一升米熟去米飲一升日三服忌海藻菘菜羊肉錫出第三卷中

人生地黃湯療傷寒有熱虛羸少氣心下滿胃中有宿食大便不利方 生地黃斤三 大黃斤四 棗二十枚 甘草二兩 芒硝二兩 石五味合搗令相得蒸五升米下熟絞取汁分再服忌海藻菘菜出第二卷中

千金瘧傷寒虛羸少氣嘔吐竹葉石膏湯方 石膏一斤 竹葉把一 麥門冬一升 人參二兩 半夏半升 甘草二兩 石六味以水一斗煮取六升去滓內梗米一升煮米熟去米飲一升日三服忌海藻菘菜羊肉錫仲景傷寒論方

張文仲枳實湯療吐下後虛羸欲死方 枳實十枚 乾薑四兩 右二味以水五升先煮枳實取二升內乾又煮三四沸去滓分再服仲景傷寒論方

傷寒不得眠方四首 病源夫衛氣晝行於陽夜行於陰陰主夜夜主臥謂陽氣盡陰氣盛則目瞑矣今熱氣未散與諸陽并所以陽獨盛陰偏虛雖復病後仍不得眠者陰氣未復於本故也卷第八

仲景傷寒論療傷寒發汗若吐下後虛煩不得眠劇則反覆顛倒心內苦痛懊懣者屬枳實芍藥湯方 枳實十枚 芍藥十兩 右二物以水四升先煮枳實取二升半去滓內芍藥更煮取一升半去滓分溫再服得吐止後服

時後療大病差後虛煩不得眠腹中疼痛懊懣烏梅散湯方 烏梅七枚 芍藥十兩 右二物以水四升煮烏梅取二升半內芍藥更煮取一升半去滓溫分再服無烏梅用枳實四枚

又半夏茯苓湯方 半夏三兩 茯苓四兩 右三味切以千里流水一石揚之萬遍澄取二斗合煮諸藥得五升去滓溫分五服忌羊肉鰾酢等物出第二卷中

深師酸棗湯療傷寒及吐下後心煩之氣晝夜不眠方 酸棗仁四兩 麥門冬一升 甘草二兩 蜩螗二兩 知母二兩

尚德漢下 有使字石 骨半夏各 一升人參 一兩無甘 草傷寒論 解後下字 嘔吐作氣 逆欲吐竹 葉三把人 米半升

尚德漢下 後枳實十 枳實十枚

茯苓 芍藥 各二兩
乾薑 三兩
三服 忌海藻 松菜 大醋 出

右

傷寒小便不利方九首

病源傷寒發汗後而汗出不止津液少胃中極乾小腸有伏熱故小便不通也

—

尚德按寫
果無論白
乃乙白字
白朮二相
五味子半
斤

仲景復論少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此為有水氣或咳或小便不利或下利或嘔者真武湯主之方

伏苓 白芍藥各三兩 附子一枚炮去白朮三兩生薑六兩

右五味切以水八升煮取三升去滓溫服七合日三若效者加五味子半升細辛一兩乾薑一兩若小便不利者去茯苓若下利者去芍藥加乾薑二兩區者去附子加生薑足前成半升忌酢者肉桃李雀

肉部
同部
第六卷
行中
大
敦師

又傷寒六七日已發汗而復下之胸脅滿結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此未解也

以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升溫服一升日三初一服敬而後下土更愈急生愈每案云

采
卷中
四

又療傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵陳湯主之方
茵陳六兩 肥梔子十四枚 大黃二兩

三酒
片洗
破

當利尿如皂莢沫狀色正赤一宿腹減黃從小便去

服桂枝湯

之方 芍藥 生薑 白朮 茯苓 各三 甘草 二兩 大棗 十二個 右六味切以水八升煮取三升去滓溫

月一升以假承運倉已滿燕移并西秋李霍汝等

月後應小月滿二便乃兼為天行
組末雄黃蜜和為丸如棗核內溺孔中令入半寸

出第二卷
中文仲同

即之與水

後陽人
後陽人
後陽人
後陽人
後陽人
後陽人
後陽人
後陽人
後陽人
後陽人

尚德按
後陽人
大字下
上字
尚德按
後陽人
大字下
上字
尚德按
後陽人
大字下
上字

水等
水等六

又太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脈促者表未解也喘而汗出者屬葛根黃連湯方 葛根八黃連

三兩 金黃芩三兩 甘草二兩 右四味切以水八升先煮葛根減二升掠去沫內諸藥煮取二升去滓溫

分再服忌豬肉冷水海藻菜

時後療傷寒若下膿血者赤石脂湯方 赤石脂一斤 乾薑二兩 附子二枚 右三味以水五升煮取三升

去滓溫分三服後膿下痛者加當歸一兩芍藥二兩用水六升煮取三升

又主下利不能食者兼療天行黃連丸方 黃連一斤 烏梅二十枚 右二味搗末蠟如博棋子一枚蜜一

升於微火煎令可丸如梧子一服十五丸日三忌豬肉冷水

又白通湯療傷寒泄利不止口渴不得下食虛而煩方 大附子一枚 乾薑二兩 甘草二兩 白

芷 右四味切以水三升煮取一升二合去滓溫分再服渴微嘔心下停水者一方加犀角半兩大良

忌海藻菰菜豬肉 右四味切以水三升煮取一升二合去滓溫分再服渴微嘔心下停水者一方加犀角半兩大良

范汪療傷寒腹中微痛不止下利秦皮湯方 秦皮一斤 黃連二兩 白頭翁二兩 阿膠三兩 右四味以

水八升煮得二升絞去滓內膠令烊適寒溫先食飲七合日二服忌豬肉冷水

又歧蘊湯療傷寒暴下及滯利腹痛方 歧蘊一斤 白朮一兩 右二物以水三升煮取一升分再

服不差復作

又蕙草湯療傷寒除熱止下利方 蕙草二兩 黃連二兩 當歸二兩 右三味切以水六升煮得二升適寒溫飲

五合日三忌豬肉冷水等

又療傷寒下利脈微足厥冷通草湯方 通草一斤 乾薑一斤 枳實四兩 人參一兩 附子一枚 右五味切

以水六升煮取二升適寒溫飲五合日三不差稍加至七合忌豬肉

小品犀角湯療熱毒下黃赤汁及赤如腐爛血及赤帶如魚腥腹痛壯 諸藥無效方 黃柏 黃芩 各

尚德按今
有方一十
一首

也。蠱病之候，齒斷無色，舌上盡白，甚者脣黑，有瘡，四肢沉重，忽忽喜眠，如此皆為蠱食其肝，肝爛見五臟。

則死富數者其上脊內有瘡吐血脣內如粟瘡者則心內懊懷痛此蟲在上食其五臟下唇內生瘡者其人不寤此蟲食下部皆能殺人也

時後若病人齒斷無色舌上白者或喜眠憤憤不知痛痒處或下利宜急療下部不曉此者但攻其上不

以為意下部生瘡蟲食其肛肛爛見五藏便死燒馬蹄作灰細末猪膏和塗綿以導下部日數度差

又桃仁苦酒湯方 桃仁五十枚去尖 苦酒二升 鹽一合 右三味煮取六合去滓溫服之

深師療蠱食下部桃皮湯方 桃皮 槐子 艾各二兩 大棗三十枚擘一 右四味切以水五升煮取三

升去滓溫分三服之

又療蠱蟲食下部方 以泥作甕以竹筒如指所橫穿甕肚筒一頭內下孔中內如雞子艾燒之人就甕

口吹之常令艾燒強人可益艾甚良

又龍骨湯治傷寒已八九日至十餘日大煩渴熱盛而三焦有瘡蠱者多下或張口吐舌呵咽爛口鼻

生瘡吟語不識人宜服此湯除熱毒止痢神方 龍骨碎斤 石一味以水一斗煮取四升沉之并底令

冷服五合餘漸漸進之惡意如飲尤宜老少無味始如飲水亦斷下

又療傷寒及諸病之後內有瘡出下部煩者黃連犀角湯方 黃連去毛 烏梅擘十四 犀角三兩 青木香半兩

右四味切以水五升煮取一升半分再服忌豬肉冷水等

范汪療傷寒心中懊懷下利穀道中澀傷當服懊懷散以蠱藥內穀道中懊懷散方 藿蘆汁乾漆 藿

蘆各二 右三味各異搗篩粉粥飲服一錢匕先食日再服

又療蠱懊懷麝香散方 麝香 雄黃 丹砂 犀角屑 羚羊角屑 青箱子 黃連 升麻 桃仁熬

目蠱各一 右十味並搗合下篩先食以小麥粥服錢五匕服藥訖復以錢五匕綿裹以導穀道中食

頃去之曰三忌猪肉冷水生血等物

小品青箱子散療熱病有蠱下部生瘡方 青箱子 藿蘆 兩狼牙 三橘皮 分蘆薈 切之 右五味搗下篩

粥飲和合服兩錢七日三不知稍增之出第六卷中并全

張文仲療傷寒兼瘧瘡王叔和云其候口唇皆生瘡唾血上唇內有瘡如粟者則心中懊憹痛如此則此

蟲在上乃食五臟若下唇內生瘡其人喜眠者此蟲在下食下部方取雞子一枚扣頭出白與漆一合

熟和令調如漆還內穀中仰吞之食頃或半日或下蟲或吐蟲劇者再服乃盡熱除病愈凡得熱病腹

內熱食少三蟲行作求食食人五臟及下部人不能知可服此藥不爾蠶蟲殺人脈論

又方 猪膽其 右一味清著半升苦酒中和之煎三沸三下三上藥成可放溫空腹飲一滿口蟲即死

有人經用之驗出第二卷中并全同

傷寒陰陽易方八首

病源傷寒陰陽易病者是男子婦人傷寒病新差未平復而與之交接得病者名為陰陽易也其男子病

新差未平復而婦人與之交接得病者名陽易其婦人得病新差未平復而男子與之交接得病者名陰

易若二男二女並不相易所以呼為易者陰陽感動其毒度著於人如換易也其病之狀身體重小腹裏

急或引陰中拘攣熱上衝胸頭重不能舉眼內生眵四肢拘急小腹疔痛手足拳臂即死其亦有不死

者病苦小腹裏急熱上衝胸頭重不能舉口節解離經脈緩弱血氣空虛骨髓枯竭便噎噎吸吸氣力轉

少著牀不能動搖起止仰人或引歲月方死卷中第八

深師療婦人得溫病雖差平復未滿一百日不可與交合交合為陰易之病病必拘急手足拳臂死丈夫

病以易婦人名為陽易連當療之可差滿四日不可療也宜令服此藥方 乾薑兩四 右一味擣末湯和

一頓服溫覆汗出得解止手足伸遂愈出第四卷中

范汪銀鼠葉湯療傷寒病後男子陰易方 薤白大 銀鼠葉十枚 右二味以水五升煮取二升盡飲之

溫卧汗出便愈亦理勞復是也時從症作虛

又丹米湯療傷寒病已後男子陰易方 丹米三 右一味末以薄酒和盡飲之溫覆汗出便愈亦隨人

通按 雄鼠

尚德 喉病 源

大小不必三兩自以意消息之

又療交接勞復卵腫腹中絞痛便絕死竹皮湯方 刮青竹皮升 右一味以水三升煮五六沸絞去滓

頸服立愈

同肘後

又療陰陽易精萎湯方 括蕞根兩 右一味以水五升煮取一升分二服先以青淡竹瀝一升合水二

升煮好銀二兩減半去銀先與病人飲之訖須臾乃服湯小便利即差括蕞湯銀汁須冷服之效

同方

千金曰昔者有人得傷寒病已差未健詣華粵視脉專曰雖差尚虛未復陽氣不足勿為勞事餘勞尚可御內即死臨死當吐舌數寸其妻聞其夫病除從百餘里來省之止宿交接中間三日發病口舌出數寸而死病新差未滿百日氣力未平復而以房室者略無不死有士蓋正者病愈後六十日已能行射獵以房室則吐涎而死及熱病房室名為陰陽易之病皆難療多死近者有士大夫小得傷寒差以十餘日能乘馬行來自謂平復以房室則小腹急痛手足拘攣而死醫者張苗說有婢得病後數十日有六人姦之皆死婦人得病易丈夫丈夫得病亦易婦人療之燒散方兼主溫病陰易也 取女人中親近隱處燒取灰 右一物為散服方寸匕日三小便即利陰頭微腫此為愈矣女人病可取男子親如前法酒水服

此方仲景方肘後同

又療交接勞復卵腫腹中絞痛便欲死者方 取交接婦人衣服以覆男子

肘後

又方取 女人手足爪二十枚女人衣中裳一尺燒 右二味末以酒服亦可米汁飲服之

出第十卷中肘後同

傷寒勞復食復方二十五首

病源傷寒病新差津液未復血氣尚虛若勞動早更復成病故云復也若言語思慮則勞神梳頭漂洗則勞力勞則生熱熱氣乘虛還入經絡故復病也其脉沉緊者宜下之又食復傷寒病新差及大病之後脾胃尚虛穀氣未復若食猪肉腸血肥魚及油膩物必大下利醫所不能治也必至於死若食餅餌糖糒

尚德按衣中裳十金作中衣帶

尚德按以十千金作已十

尚德按
後甘草三
兩或八合
有赤石脂
三兩十金
豆豉一升

脯及膾臠菜諸果牢強難消之物胃氣虛弱不能消化必更結熱通以藥下之則胃氣虛冷大利難禁不
下之必死下之亦危皆難救也大病之後多生此死不可不慎護也夫病新差後但得食糜粥寧可少食
令飢慎勿飽不得悅有所食雖思之勿與引日轉久可漸食羊肉糜若羹汁慎不可食猪狗等肉並出第
八卷中
廣濟療傷寒因食勞復頭痛壯熱梔子湯方 梔子十四枚香豉一升葱白一握棗米三合雄鼠屎二七粒
石五味以水八升煮取二升三合去滓內鼠屎分三服服別相去如人行六七里須利內芒硝五分忌
麪炙肉蒜等物並第一

深師療勞復大青湯方 大青兩四甘草炙阿膠炙香豉兩各二 右四味切以一斗煮取三升去滓溫服一

升日五六欲盡復作常使有湯渴便飲無毒除熱止吐下傷寒一二日上至十數日困篤發汗熱不解

吐下後熱不除止下痢甚良先煮大青甘草取四升去滓內膠豉膠消盡便瘕去勿令豉壞當預清膠

今釋也忌菰菜海藻并金同後

又方 取雞子空殼辟之熱令黃黑持篩熱湯和一合服之溫卧取汗愈雞子殼悉服之并後崔氏同

又方 取馬糞燒搗為散冷酒服方寸匕良三炷頃便驗神良

又療傷寒差後勞復葵子湯方 葵子并梁米升 右二味合煮作薄粥飲之多多為佳取汗立差並出第十

中卷

范汪療傷寒病差語言疏坐起行步勞復方 剉青竹皮多多煮之令厚濃服三升汁則愈

又傷寒已愈食飲多勞復大黃豉湯方 豉五升甘草炙桂心各二大黃四兩芒硝半 右五味以水六

升煮得二升去滓先食適寒溫飲一升日再忘海藻菰菜生蔥等物

又療傷寒差已後飲食勞復梔子湯方 梔子十四枚豉一升桂心 麻黃 大黃各二 右五味以水六

水七升先煮麻黃掠去沫內餘藥更煮取二升去滓溫服一升日再服當小汗及下利忌生蔥並出第十四

中卷

尚德按十
金取所食
餘病為未
飲調服二
錢已日以
三服後
燒飯米
服方寸已
高以煎
七升先煎
藏三升次
內枳實
升取二
升傷寒
同餅按
尚德按
作餅二升

千金療傷寒溫病後勞復或食飲或動作梔子石膏湯方 梔子仁三枚 石膏五兩 鼠屎二升 香豉一升

右四味以水七升煮取三升分三服

又療勞復或因洗手足或梳頭或食等冷復方 取手足汁洗飲之一合即愈

又方 取頭垢如棗核大吞一枚

又方 取飯燒為末飲進一升附後

又療大病已差勞復者枳實梔子湯方 枳實三枚 梔子十四枚 右二味以酢漿一斗先煎取六升煮藥

取三升內豉一升煎五六沸去滓分再服覆取汗如有宿食者內大黃如棗子一枚同出第十卷中

如博學子五六枚

又療勞復垂危者方 煖湯三合洗四五歲女子陰取汁內口中服則愈男兒亦得起死方

又療食勞方 麴一餅煮取汁服之

又療食勞方 杏仁五十枚酢二升煎取一升服之取汗則差

又方 燒人糞反水服之方寸匕

又療傷寒差後更頭痛壯熱煩悶者方 服黃龍湯三合日三服

又欲令病人不復者方 燒頭垢如梔子大服之十卷中

崔氏療傷寒勞復鼠屎湯方 梔子二枚 鼠屎五枚 右三味以漿水二升煮取一升去滓頓

服數試異驗卷中

古今錄驗梔子湯療傷寒勞復方 梔子十四枚 麻黃二兩 大黃二兩 豉一升 右四味切以水七升煮取二

升分為二服附後

又療傷寒勞復鼠屎湯方 鼠屎二枚 豉一升 梔子七枚 大黃三兩 右四味以水五升煎取二升七合

分三服微取汗鹿小鴨溲下同金

傷寒百病方八首

又療病新差早起及食多勞復鼠屎豉湯方 鼠屎兩頭共者 豉二十一枚 香豉升 右二味以水三升煮取一升盡

服之溫卧令小汗財金

又療食不消勞復脉實者鼠屎梔子豉湯方 豉二升 鼠屎二十枚 梔子一枚 麻黃三兩 右四味以水五

升煮取二升分服七合微汗出日三服財金麻黃

又療傷寒已愈食飲多復發者方 豉五合 甘草二兩 大黃四兩 芒硝半 右四味切以水九升煮取三升

去滓飲一升日再忌菹菜海藻等同注

又療傷寒差令不復白芷散方 白芷升二 白朮升 防風升 桔梗升 枳實升 細辛升 附子二分 乾薑

桂心銘二 石九味搗篩為散 以粳米粥清服一錢匕食已服二錢小兒服一錢常以雞子作羹喫粳

米飯多少與病人食之亦未必常有雞子羹粳米飯如服藥訖即扶起令行步仍搗頭洗手面食輒服

之勞行如前則不復浩云數用佳忌猪肉桃李雀肉胡荽蒜青魚鮓生蔥生菜范注同出第三卷中

傷寒百病方七首

病源傷寒百病者謂無經絡百脉一宗悉致病也皆因傷寒虛勞大病之後不平復變成斯病也其狀

意欲食復不能食常默默欲得卧復不得卧欲出行而復不能行飲食或有美時或有不用時聞飲食臭

或如強健人而欲卧復不得眠如有寒復如無寒如有熱復如無熱至朝口苦小便赤黃百合之病諸藥

不能療得藥則劇而吐利如有神靈所加也身形如和其人脉微數每床輒頭痛其病六十日乃愈若尿

時頭不痛漸漸然如寒者四十日愈若尿時快然但眩者二十日愈其證或未病而預見或病四五日而

出或病二十日一月日復見其狀惡寒而嘔者病在上焦也二十三日當愈其狀腹滿微喘大便硬三四

日一大便時復小溲者病在中焦也六十三日當愈其狀小便淋瀝難者病在下焦也四十三日當愈各

隨其證以療之耳范注中

仲景傷寒論療百合之病諸藥不能療若得藥則劇而吐痢如有神靈所加也身體仍和脉微數每尿時

尚德按今有方八首

尚德按病源作鄭

尚德按要略體問作

形如惡瘰
之各隨
證治之
尚德接末
字下要略
有出字

尚德接末
要略作末

尚德接末
作如漆
是末要略

尚德接末
略文與此
小異外臺
似晒

輒頭痛六十日乃愈尿時頭不痛漸漸然者四十日愈尿時快然但頭眩者二十日愈其證或未病而預見或病四五日而出或病二十日一月復見者悉療之

又發汗已更發者百合知母湯主之方 百合散知母散 右二味以泉水洗先漬百合經一宿上當

白沫瀉却其汁更以好泉水二升煮取一升去滓置之一處別以泉水二升煮知母取一升去滓二味

汁相和煮取一升半分溫再服之金品十

又下之已更發者百合滑石代赭湯主之方 百合散代赭湯 右三

味先以泉水二升煮百合取一升去滓置一廂又以泉水二升煮和二味取一升去滓合煎取一升半

分再服金品十

又吐之已更發者百合雞子湯主之方 百合散 右一味依前法泉水二升煮取一升去滓扣雞子一

枚取中黃內百合湯中攪令調溫再服之金品十

又不吐不下不發汗病形如初百合生地黃湯主之方 百合散 右一味依前法漬以泉水二升煮取

一升生地黃汁一升二味汁相和煮取一升半溫分再服一服中病者更勿服也大便當出惡沫金品十

又百合病一月不解變成渴者 以漬百合水洗身法其後千金方中一味是後服栝實牡蠣散其次則

是並出第十卷中

小品凡百合病見於陰而以陽法攻之其陰不得解也復發其汗此為逆其病難治見於陽而以陰法攻

之其陽不得解也復下之其病不愈

千金百合病經一月不解變成渴者方 百合根切一 右一味以水一斗漬一宿以汁洗病人身也洗

身訖食白湯餅餅也勿與鹽豉也渴不差可用栝實並牡蠣等分為散飲調方寸匕日三服小品張仲

又療百合病變而發熱者方 滑石兩三 右二味末之飲下方寸匕日三微利者止勿服之

十卷必更 卷二 傷寒百病方七百 傷寒錄成病方四百

執即除一本云治百合病小便赤澀臍下堅急

又百合病變腹中滿痛者方但服百合根隨多少熱令色黃末之飲調方寸匕日三滿消痛止
並出第

十卷

傷寒狐惑病方四首

仲景傷寒論狐惑之病其氣如傷寒嘿嘿但欲卧目瞑不得眠起卧不安蝕於喉咽者為惑蝕於陰者為狐狐惑之病並惡飲食不欲聞飲食臭其面乍赤乍黑乍白蝕於上部其聲啞蝕於下部其咽乾蝕於上部其心湯主之蝕於下部苦參湯淹洗之蝕於肛外者雄黃熏之

又瀉心湯兼療下利不止心中煩渴堅而嘔腸中鳴者方半夏升黃芩升人參升乾薑升三黃連升

甘草四兩大棗十二枚右七味切以水一斗煮取六升分服一升日三服忌豬肉冷水菰菜海藻羊

肉錫千金同出

又雄黃熏法兼主蠱病雄黃一物研末以兩筒瓦合之燒以熏下部

千金療狐惑黃連黃連湯方黃連灶黃草右二味切以白漿一斗漬之一宿煮取二升去滓分

為二服忌豬肉冷水小品

又其人脉數無熱微煩嘿嘿但欲卧汗出得之三四日眼赤如鳩眼者得之七八日其四眦黃黑能食者膿已成也療之方以赤小豆三升漬之令生芽足復之乾加當歸三兩為末漿水服方寸匕日三同

第十卷中此

凡病形不可灸因火為邪散走血脉傷脉尚可傷藏則劇并輸穴腫黃汁自出經絡外爛肉腐為癰膿此為火疽七醫所傷也凡微數之脉慎不可灸因火為邪即致煩逆虛損散脉中火氣雖微內攻

有刀焦骨傷筋血難復也

尚遠按十
金此論左
前復也下
有應在瀉
心四字次
主治并方
知上治方
又按散走
白脉十金
中作血散

又按要略
略名甘草
高德按要
又按傷寒
論六升下
有去滓再
煎取三升
七字

唐王燾先生外臺祕要方卷三目錄天行二

天行病發汗等方四十二首

天行病方七首許仁別

天行嘔逆方七首

天行嘔哕方七首

天行喉咽痛方二首

天行衄血方四首

天行口瘡及口乾苦方四首

天行欬嗽方五首

天行發斑方三首

天行發瘡豌豆疱瘡方一十三首

天行虛煩方二首

天行狂語方三首

天行熱毒攻手足方五首

天行大小便不通脹滿澀方四首

天行熱痢及諸痢方四首

天行蠱瘡方八首

天行陰陽易方二首

天行虛羸方二首

天行後禁忘方二首

天行勞復食復方六首

天行差後勞發方五首許仁別

尚德按
字下疑脫

尚德按
字上疑脫

唐王憲先生外臺秘要方卷三

宋朝敬大夫守光祿卿直祕閣判登聞鼓院上護軍臣林億等上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

男龍錫為光父全校

天行病發汗等方四十二首

尚德按病
源利湯作
雞子湯亦
與作亦如

病源夫天行時氣病者是春時應暖而反大寒夏時應熱而反大涼秋時應涼而反大熱冬時應寒而反大溫者此非其時而有其氣是以一歲之中病無長少率多相似者此則時行之氣也從立春節後其中無暴大寒又不冰雪而人有壯熱為病者此屬春時陽氣發於冬時伏寒變為溫病也從春分以後至秋分節前天有暴寒者皆為時行寒疫也一名時行傷寒此是節候有寒傷於人非觸胃之過也若三月四月或有暴寒其時陽氣尚弱為寒所折病熱猶小輕也五月六月陽氣已盛為寒所折病熱則重也七月八月陽氣已衰為寒所折病熱亦小微也其病與溫及暑病相似但治有殊耳然得時行病一日在皮毛當摩膏火灸愈不解者二日在膚可法鍼服解肌散汗出愈不解三日復發汗若大汗則愈不解者止勿復發汗也四日在胃服藜蘆丸微吐之愈若病固服藜蘆丸不吐者服赤小豆水帶散吐之即愈視病者尚未了了復一法針之當解不愈者六日熱已入胃乃與利湯下之愈百無不如意但當識視節度與病耳若食不消病亦與時行病俱發熱頭痛食病當速下之時行病當待六七日下之時行病始得一日在皮二日在膚三日在肌四日在胃五日入胃入胃乃可下也熱在胃外而下之則熱乘虛便入胃然病要當復下去之不得留於胃中也胃若實熱致此為病三死一生此輩皆多不愈胃虛熱入爛胃也其熱微者赤斑出劇者黑斑出赤斑出者五死一生黑斑出者十死一生但論人有強弱病有難易功效相倍耳病者過日不以時下之熱不得泄亦胃爛斑出矣若得病無熱但狂言煩躁不安精采言語與人不相當者勿以火迫之但以猪苓散一方寸匕水和服之當以新汲冷水令強飲一升若一升半可至二升益

汗宋本作
脚

肉宗本作
肉

宋本心作
正無胸字

佳以指刺喉中吐之隨手愈不即吐者此病輩多不善勿彊與水水停即結心下也更當以餘藥吐之皆令相主當者不爾必危若此病不急以猪苓散吐解之者其死殆速矣亦可先以去毒物及法針之尤佳其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云清旦初起以左右手交互從頭上挽兩耳舉又引鬢髮即流通令頭不白耳不聾又摩手掌令熱以摩面從上下二七止去汗氣令面有光又摩手令熱從體上下名曰乾浴令人勝風寒時氣寒熱頭痛百病皆愈

又時氣病一日太陽受病太陽為三陽之首主於頭項故得病一日頭項腰脊痛

又時氣二日陽明受病陽明主於肌肉其脈絡鼻入目故病二日內熱鼻乾不得眠夫諸陽為表表始受病皮膚之間故可摩膏火灸發汗而愈

又時氣病三日少陽受病少陽脈循於脅上於頸耳故得病三日胃脅熱而耳聾也三陽經絡始相傳病未入於藏故可汗之而愈

又時氣四日太陰受病太陰為三陰之首是知三日已後諸陽受病訖即傳之於陰而太陰受病焉其脈主於咽嗑故得病四日腹滿而嗑乾其病在胃腸故可吐而愈也

又云夫得病四日毒在胃腸故宜取吐有得病二三日便心胃煩滿此為毒氣已入或有五六月已上毒氣猶在上焦者其人有痰實故也所以復宜取吐也

又時氣病五日少陰受病少陰脈貫腎絡肺繫於舌本故得病五日口熱舌乾渴而引飲其病在腹故可下而愈

又時氣病六日厥陰受病厥陰脈循陰器絡於肝故得病六日煩滿而囊縮也此為三陰三陽俱受病毒氣入於腸胃故可下而愈

又時氣病七日法當小愈所以然者陰陽諸經傳病竟故也今病不除者欲為再經病再經病者謂陰陽

又時氣病八九日以上不解者或是陰陽諸經重受於病或已發汗吐下之後毒氣未盡所以病不能除或一經受病未即相傳致使傳滯累日病證不改者故皆當察其證候而治之

並出第九卷中士弱氏曰七日傳經盡再傳經必七日蓋利復之義耳

水八升先煮麻黃葛根三兩沸去沫內諸藥煎取二升五合絞去滓分為三服服別相去如人行五六

里更進一服才利覆取汗後以粉粉身忘風及諸熟食

肘後療天行一二日麻黃解肌湯方
麻黃去節升麻兩甘草兩芍藥兩石膏兩杏仁三十枚
去

貝齒三枚
右七味細切以水三升煮取一升頓服覆取汗汗出則愈便食鼓粥補虛也忌海藻菘菜

千金同

又方 麻黃^{二兩} 黃芩^{各一兩} 桂心^{各一兩} 生薑^{三兩} 右四味切以水六升煮取二升分三服忌生葱^{張文仲同}

又葛根解肌湯方 葛根_{四兩}芍藥_{二兩}麻黃_{一兩}大青_{一兩}甘草_{一兩}黃芩_{一兩}石膏_{一兩}大棗_{四枚}桂心_{一兩}

右九味切以水五升煮取二升分溫三服相次服之覆取汗差忌海藻菰菜生葱炙肉等

又療二三日以上至七八日不解者可服小柴胡湯方
柴胡八兩 人參三兩 甘草三兩 黃芩三兩 生薑三兩 半夏

大棗十枚 右七味切以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升分三服微覆取汗半日更差

如不除更服一劑忌海藻松菜羊肉錫范江張文仲同此

又若有熱實得汗不解脹滿貢桑欽王語者可服大紫月易方
紫月半二黃二青二白藥二只

四枚半夏五兩主薑五兩大棗十二
古人未以水一升二升煮反六升六升煮反三升五升反一升

日三服當微利是辛肉易也方曰煎第一魚疾頭煎兩生丁得與魚更下丁不令其共湯上者八

三月官行和意三月食四方百量第一急丹汗有辛可得藥處便不可不營之保無傷死諸小

升家本作
尚德按肘
後生薑八
兩無者乾
薑三兩半
夏五兩水
九升煮取
二升半
尚德按肘
後黃芩三
兩枳實十
枚水一斗

斗室必是
天行病發汗等方四十二首

二

煮取四升
分爲四服
急疾須臾
有作急須
者不可作

喘下家
本有喘音
吸三小字

痛下家
本有痛音
反三小字

尚德按千
金服一升

指字下家
本有音塔
二小字

刪繁療天行三日外至七日不歇肉熱令人更相染著大青消毒湯方 大青四兩香豉八合無綿裹 乾葛 柘

子各四兩 生乾地黃切一升芒硝三兩 右六味切以水五升煮諸藥味取二升五合去滓下芒硝分三服忌

蕪荑熟麴酒蒜等物一方有石

又療天行五日不歇未至七日皮肉毒熱四肢疼痛強苦參吐毒熱湯方 苦參八兩烏梅七枚雞子三枚

右三味以苦酒三升煮二物取一升去滓澄清下雞子白攪調溫去沫分再服之當吐毒熱氣出愈

又療天行七日至二七日藏腑陰陽毒氣天行病欲歇而未歇或因食飲勞復心下脹滿煩熱生地黃湯

方生地黃切一黃芩三兩桂心二兩甘草二兩 竹葉切一兩 香豉別裹一升 蕪心一兩芒硝三兩 六鼠屎七枚 乾葛一兩

麻黃去節石骨八兩 右十二味切以水九升煮取三升去滓下芒硝分三服忌蕪荑海藻松菜生

葱等

又療天行二七日外至三七日不歇或寒或熱未去喘噎四肢羸瘦飲食不能腹中虛滿熱毒不安生地

黃湯方 生地黃汁一升 麥門冬汁一升 赤蜜一升 人參二兩 白朮三兩 桂心一兩 甘草二兩 生地骨皮四兩 麻三兩 石

骨八兩碎 蕪心一升 右十一味細切以水九升煮諸藥味取二升去滓下地黃汁更煎三兩沸分溫五

服晝四夜一服忌蕪荑生葱海藻松菜桃李雀肉等物

又療天行三七日至四七日勞瘵不歇熱毒不止乍寒乍熱乍劇乍差發動如瘡癰甲湯方 鼈甲三兩

大青二兩 石膏八兩碎 牡丹皮一兩 烏梅肉一兩 常山三兩 竹葉切一兩 牛膝根三兩 甘草一兩 香豉一升 熟右十味

切以水九升煮取三升分溫三服日三忌生葱生菜鯉魚海藻松菜蕪荑生一方有生天門冬

千金療天行熱病五六日以上宜服苦參湯方 苦參三兩 黃芩二兩 生地黃八兩 右三味切以水八升煎至

二升去滓溫服半升日再忌蕪荑出第九卷中

又凝雪湯療天行毒病七八日熱積胃中煩亂欲死起死擒湯方 芫花一升 右一味以水三

升煮取一升半漬故布薄胃上不過再三薄熱則除當溫四肢護嚴逆也張文仲備急古今錄驗深師

此方治折也指也又指也

千金翼療天行脈浮緊無汗而發熱其身疼痛八九日不解其表證續在此當發其汗服藥已微除發煩

目頭刺者必齟齬乃解所以然者陽氣重故也宜服麻黃湯方千金翼不麻黃三兩桂心二兩甘草一兩

杏仁七十枚右四味切以水九升先煎麻黃減二升去上沫內諸藥者取二升半分服八合取汗

不須飲粥投此湯易得汗忌葷菜海藻生葱此張仲景論方

崔氏療時行數日而大下熱痢時作白通諸藥多不得止吾思舊方多療傷寒後下痢耳未有尚在數日

便兼除熱止下者也四順湯熟白通苦溫故吾思作此湯以救數十人兼主傷寒黃連龍骨湯方黃連

三兩止黃柏三兩止熟艾如雞子一枚龍骨二兩止右四味切以水六升煮取二升半分三服無不

斷者忌猪肉冷水

又其年時行四五日大下後或不下皆患心中結滿兩脅痞塞胃中氣急厥逆欲絕心胃高起手不得近

不過二三日輒便死發諸醫用瀉心湯余用大小陷胸湯並不得療重思此或是下後虛逆而氣已不理

而毒復上攻毒氣相搏結於胸中縱不下者毒已入胃胃中不通毒還衝上復搏於氣氣毒相激故致此

病療之當先理其氣次下諸疾思與增損理中丸方人參二兩白朮二兩甘草二兩乾薑六分枳實二兩

實四枚茯苓二兩牡蠣二兩右八味末之以蜜和為丸服如彈子一丸熟水下不歇復服余時用此效的

神速下喉即折續復與之不過服五六丸胃中豁然矣用藥之速未嘗見此然渴者當加枳實不渴除

之下者當加牡蠣不下勿用余因以告領軍韓康伯右衛毛仲祖光祿王道豫靈臺郎顧君苗著作商

仲堪諸人並悉用之咸歎其應速于時枳實乃為之貴難者曰傷寒熱病理中溫藥今不解之以冷而

救之以溫其可論乎余應之曰夫今詠時行始於項疆初色次於失眠發熱中於煩躁思水終於生瘡

下痢大齊於此耳忌海藻松菜酢物桃李雀肉等深師方同

又阮河南療天行七八日熱感不解艾湯方苦酒三升蔥子二合生艾汁取一升無生艾熟艾乾艾亦可

右三味煎得一升頓服愈若有牛黃內一刀圭尤良此宜療內有大熱也阮河南曰療天行凡除熱解毒無過苦醋之物故多用苦參青柏艾草蘼苦酒烏梅之屬此其要也夫熱盛非苦醋之物則不能愈熱在身中既不時治治之又不苦酢之藥如救火不以水必不可得脫免也又曰今諸療多用辛甜薑桂人參之屬此皆貴價難得常有比行求之轉以失時而苦參青柏草蘼子艾之屬所在盡有除熱解毒最良勝於向貴價藥也前後數參並用之得病內熱者不必按常藥次也便以青柏苦參艾苦酒療之但稍與促其間耳無不解千金集驗同並出於第一卷中

又茵陳丸療瘴氣時氣及黃病瘡瘡等方 茵陳二兩 大黃五兩 豉五合 常山三兩 梔子仁二兩 龍甲二兩 芒硝二兩

二杏仁三兩 巴豆二兩 右九味搏篩蜜和為丸初得時氣三日內平旦飲服每服一丸九如梧

子大如人行十里久或吐或利或汗如不吐及不利不汗更服一丸五里久不吐利汗則以熱飲投之老小以意量減黃病瘡濕時氣傷寒瘡瘡小兒驚熱欲發癰服之無不差者療瘡特神驗有人患赤白痢者服之亦差春初有宿熱依上法服之取吐利當年不憂熱病忌葷菜蘆笋野猪肉生蔥生菜出第二卷

中干

張文仲療天行若已五六日不解頭痛壯熱四肢煩疼不得飲食大黃湯方 大黃半兩 黃連半兩 黃柏半兩

梔子半兩 右四味切以水八升煮取六七沸內豉一升蔥白七莖煮取三升分三服此許推然方神

良又療傷寒已五六日頭痛壯熱四肢煩疼取汗並宜老小忌猪肉冷水小品備

又支太醫桃葉湯熏身法 水一石煮桃葉取七斗以薦席自圍衣被蓋上安桃湯於牀簣下取熱自熏

俾少時當雨汗汗遍去湯待歇速粉之并灸大椎則愈

又廩止藥法 經云連發汗汗不出者死可蒸之如中風法後以問張苗苗云曾有人疲極汗出卧單

中冷但苦寒踈四日九八過發汗汗不出苗燒地桃葉蒸之則得大汗被中傳粉極燥便差後用此法

發汗得出療之備急方同

又療天行熱毒垂死破棺千金湯方 苦參一右一味咬咀以酒二升半舊方用苦酒煮取半升去滓停服當吐如燂膠便愈神驗附後同延年治天行四五日結

延年秘錄療天行頭痛壯熱一二日水解散方 麻黃四兩大黃三兩黃芩三兩桂心二兩甘草二兩芍藥二兩

右六味搗篩為散患者以生熟湯浴訖以煖水和服方寸匕覆取汗或利則便差丁強人服二方寸匕

忌海藻生葱松菜生菜古今雜驗同十金與黃芩芍藥

又梔子湯主天行一二日頭痛壯熱心中熱者方 梔子三兩黃芩三兩豉一升葛根一升蔥白一升石膏四兩碎乾

葛根四兩右六味切以水七升煮取二升六合去滓分溫三服如人行八九里再服忌麴酒生冷等物

又解肌湯主天行病二三日頭痛壯熱者方 乾葛四兩麻黃三兩芍藥二兩黃芩二兩甘草一兩大棗十二枚

心一兩右七味切以水八升煮取二升半去滓分溫三服得汗愈忌海藻松菜生蔥等附後同

又療欲似天行四五日熱歇後時來時往惡寒微熱不能食者知母湯方 知母二兩枳實三兩梔子仁三兩

豉一升右四味切以水六升煮取二升半去滓分溫三服如人行八里一服忌蒜麴

又療天行五日頭痛壯熱食則嘔者竹茹飲方 竹茹二兩生薑三兩黃芩二兩梔子仁二兩右四味切以水五

升煮取一升六合去滓分溫三服忌蒜麴等五日

又療天行五六日頭痛骨節疼痛腰痛兼黃芩湯方 黃芩三兩梔子仁三兩芍藥三兩豉一升右四味水

六升煮取二升半去滓分三服忌物依前

又柴胡湯主天行五六日壯熱骨煩疼兼兩脅連心肋下氣脹急硬痛不能食恐變發黃者方 柴胡三兩枳

實三兩枳實三兩黃芩三兩梔子仁三兩茵陳三兩龍膽二兩大黃三兩右八味切以水九升煮取二升七合去

滓分溫三服忌麴蒜九卷中

又竹茹飲主病後得天行病頭痛三四日食即嘔吐者方 竹茹二兩橘皮二兩生薑四兩人參二兩蘆根一升

米合 右六味切以水六升煮取二升五合去滓分溫五六服中間任食忌麴生仲張文

天行病後汗等方四十二首

又療天行熱病七八日成黃面目身體悉黃心滿喘氣羸氣急者茵陳丸方 茵陳三兩黃五兩梔子仁二兩

黃芩二兩薑甲二兩常山二兩芒硝二兩巴豆一兩升麻二兩豉三合右十味搗師以蜜和為丸如梧子大

患者飲服三丸以得吐利則差忌覓菜生蔥生菜野猪肉蘆笋卷第十右十味搗師以蜜和為丸如梧子大

救急療天行熱氣頭痛骨肉酸疼壯熱等疾若初病一日在毛髮二日在皮膚三日在肌肉必未得取利

且宜進鼓尿湯方 豉一升葱白一升小便者三升重子 右三味先熬豉及葱白令相得則投小便煮取一

升澄清及熱頓服或汗或利但差則得如未歇依前更進一劑頻用有效

又如不降進紫胡湯方 麻黃二兩紫胡三兩甘草二兩乾葛三兩石膏五兩蔥白根一升勿

一作熱白即冷 豉三升出之 右八味切以水九升宿漬藥明旦先煮麻黃令沸掠去上沫然後并諸

藥煮取一升七合分三服服別相去三食頃良久覆取汗汗出以粉拭之惡寒多加桂心一兩忌海藻

松葉等

又療天行病不即差經四五日渴引飲心上急強手不得近又不得眠荒亂此則是黃不必得待刺黃始

服藥凡是心強氣急不得眠卧服此湯吐即差水帶散方 水帶似帶一合熱令小豆一合通按小豆

減也 右二味搗師為散凡有病如前候及天行病得四五日不歇皆宜服此方以漿飲五合和散一

錢匕服之二食久必吐不吐更與半錢匕服吐畢即差中男以上量意斟酌服之

又天行病若大困患人舌燥如鋸極渴不能服藥者宜服乾薑湯一名破棺湯解大熱方 陳久乾人薑

升一大 右一味以沸湯一大升沃此薑一食久澄清溫取一升頓服如渴不止者又依前法更服此宜

灸從心厭骨向下一寸半名巨闕取患人中指節為寸灸三十壯若無心厭骨則以中指節前量橫拈

心上至岐骨上兩頭築著骨當機量下以前一寸當中直下則是巨闕也士弱氏曰同身寸以

必効療天行一二日者方 麻黃去節 右一味以水四升煮去沫取二升去滓則者米一匙及豉為

稀粥取強一升先作生熟湯浴淋頭百餘碗然後服前粥則厚覆取汗於夜最佳

僅宋本作

又療天行病經七日以上熱勢彌固大便溢泄心腹痞滿食飲不下精神昏亂恍惚狂言浪語脈沉細衆
狀之中一無可救宜決計服此鼈甲湯方 鼈甲二兩 細辛二兩 桂心二兩 白朮二兩 生薑四兩 吳茱萸二兩 白鮮皮

二附子一兩 枳實二兩 茵陳二兩 大黃三兩 右十一味切以水八升煮取二升六合去滓分三服用別
相去如人行五里進一服忌生葱生菜薤菜猪肉桃李雀肉等

又療天行十日以上腹微滿譫語或汗出而不惡寒體重短氣腹滿而喘不大便繞臍痛大便乍難乍易
或見鬼者大承氣湯方 大黃四兩 厚朴二兩 枳實五枚 芒硝三合 右四味切先以水一斗煮取二味五

升去滓內大黃復煮取二升去滓內芒硝煎令三兩沸適寒溫分再服得下者止不下更服之 並出第
三卷中

此張仲景
傷寒論方

古今錄驗八毒大黃九療天行病三四日身熱目赤四肢不舉產乳後傷寒古黃白狂言妄語亦療溫病
已後飛尸遁尸心腹痛隔上下不通癖飲積聚癰腫苦痛溫中摩痛上諸毒病方 藜蘆二分 大黃三分 珠

砂五分 蜀椒四分 雄黃四分 巴豆四分 桂心四分 右七味搗篩蜜和為丸如麻子大飲服三丸當下不差
更服合時勿令婦人雞犬見之忌生葱野猪肉蘆笋狸肉生血物

又牽馬丸療天行病四五日下部生瘡醫所不能療者方 附子一枚 藜蘆一兩 桂心一兩 巴豆一兩 右四味搗篩研已豆如膏和散蜜丸如梧桐子空腹服二丸熱在臍上不下飲半升熱飲投吐之後下

下部瘡自差神良病家嘗牽馬買藥因名牽馬丸老小半之以意消息之忌野猪肉生葱狸肉蘆笋等
物

又療若六七日熱盛心煩狂言見鬼者方 絞人糞汁飲數合服良 卷中第
三 近效療天行三日外若忽覺心上妨滿堅硬脚手心熱則變為黃不療殺人 秦光湯方 秦光一兩 紫草一兩

白鮮皮兩 黃芩兩 梔子兩 右五味切以水一大升半牛乳一大升煮取七合分為二服老小以意量
之一劑不愈更喫一劑試有效

生家本作主

天行病方七首

此方兼療傷寒為題云天行所以入天行部

許仁則云此病方家呼為傷寒有二種有陰有陽陰傷寒者反於陽是也陽傷寒狀表裏相應心熱則口乾苦肝熱則眼赤暈脾熱則穀道稍溫腎熱則耳熱赤肺熱則鼻乾渴胃熱則嘔逆大腸熱則大便秘澀小腸熱則小便赤少皮膚熱則脈洪數身體熱反此者乃陰傷寒夫傷寒者則為寒所傷也寒生陰陰主殺凡人陰陽調則無病氣既為寒所傷便致斯疾也

又論陰陽傷寒者則毒氣傷陰陽氣也人身中有陰陽之氣陰陽者則寒熱也本以陰為毒所傷則不能流行陽熱獨王故天行多熱者也以病於諸病之中最難為療陰陽二病陰尤可憂耳時聞有此病而多倉卒死者不少或由診候不能精審方藥未達指歸飲食乖宜寒溫失節故致爾自心不全甄別他醫難得精妙與其療也甯可任之但能滋味適寒溫將理中間冷暖守過七日此最為得計其中事須服藥不可徒然者唯多日大便不通暫須一轉洩耳病輕一二日覺身體壯熱頭痛骨肉酸楚背脊強口鼻乾手足微冷小便黃赤此是其候若如是宜先合煮桃柳等三物湯浴之方 桃枝五斗切柳葉五斗切酢漿水一斗右藥先以水一石煮桃柳枝葉二物取七斗汁去滓內醋漿水攪帶熱以浴浴訖拭身體令乾以粉摩之勿觸風則於密處刺頭眼後兩邊及舌下血斷以鹽未厭刺處則入被卧

又後服解肌乾葛等五物飲微覆取汗如病根輕者因此或歇方 葛根切五蔥白切一生薑切一豉心一一升梗米二合右藥切以水五升煮取豉心以上四味取三升半汁去滓內梗米屑煮令米爛帶熱

頓啜候盡微覆取汗無所忌

又依前浴等法不覺歇宜更作雞子湯重洩之方 新穀產雞子五枚 右各破頭洩置一盞中別加一

雞子水以筋攪令極渾別用水一升煮極沸則投雞子於湯中微攪繞似熟則瀉置碗中內少醬清似變腥氣帶熱啜令盡覆使汗出

又依前雞子湯出汗汗或當歇如不覺退合梔子等六味散以下之方 梔子三十枚乾葛五兩茵陳二兩升

病源胃家有熱穀氣入胃與熱相并氣逆則嘔或吐下後飲水多胃虛冷亦為嘔也出第九卷中

廣濟療天行惡寒壯熱食則嘔逆前胡湯方 前胡一兩 麥門冬三兩 竹茹二兩 橘皮一兩 甘草一兩 生薑二兩

地黃四兩 右七味切以水七升煮取二升三合絞去滓分溫三服服如人行六七里進一服忌海藻

松菜蕪菜麴猪犬肉油賦出第一卷中

崔氏療天行數日或十許日而表不解心下有熱毒相搏遂嘔時復有效者增損阮氏小青龍湯方

麻黃二兩 芍藥二兩 桂心一兩 甘草二兩 細辛一兩 右五味切以水六升煮取二升溫服七合阮本湯方等

分雖未嘗用嫌其太溫余增損其分兩以療十餘人皆愈忌海藻松菜生蔥生菜等出第一卷中

近效療天行壯熱嘔逆不下食橘皮湯方 橘皮三兩 生薑四兩 茯苓三兩 右三味切以水五升煮取一升五

合去滓分溫五六服中間任食一日服盡忌大酢蒜麴並同出第九卷中

必效療天行嘔吐不下食方 取臘月兔頭并皮毛燒令煙盡麴破竹黑灰搗羅之以飲汁服方寸匕則

下食不差更服燒之勿令大耗無所忌比用頻效出第一卷中

救急療天行後嘔逆不下食食入則出方 取羊子肝如食法作生淡食不過三兩度則止文仲同

又方 以雞子一枚於沸湯中煮三五沸則出水浸之外寒內熱則吞之神效無所忌並出第一卷中

集驗療天行後氣膈嘔逆不下食生蘆根湯方 燈心分生 麥門冬二分 人參四分 生蘆根一大 右

四味以水一大升煎取八合去滓分溫三服

天行嘔哕方七首

病源伏熱在胃令人胃滿胃滿則氣逆氣逆則噦若大下後胃氣虛冷亦令致噦也出第九卷中

肘後療嘔哕不止橘皮甘草湯方 甘草一兩 橘皮三升 麻半生薑 右四味切以水三升煮取一升

盡服之日三四作當止忌海藻松菜文仲同出第二卷中

文仲近效療嘔逆麥門冬飲子方 麥門冬心 蘆根 人參各二 右三味切以水六升煮取二升七合

尚德按要
略半夏一
升以水七
升煮取一
升半分溫
再服
宋本無止
字
煎家本作
者
通按傷寒
論中無此
方仲景
金匱要略
內載之

去滓分溫五服徐徐服常用有驗

又方 煎生薑汁三二合大良

又方 把枇杷葉去毛煮飯之作粥亦佳出第一卷中

又方 研油麻汁煮菹豆令爛取半升許以手掌大捩皮燒作灰篩之內豆中和食出第二卷中

故急療天行乾嘔若噦手足逆冷雞鼓粥方 雞白切一香豉升白米合 右三味以水一升煮豉一沸

漉去滓下雞及米煮為稀粥進兩碗良

又療天行後噦欲死兼主傷寒小半夏湯方 半夏五兩洗生薑八兩切令薄細勿令 右二味各以水

三升別煮各取一升半去滓二汁相和一處共煮取二升分三服服相去人行十里久當令下食其噦

不過俄頃則止近二公及任理居中屬編得之明奉御來象執秘此方但止煮藥送來象與方郎中隣

居後乃方便得之大良效忌羊肉錫傷寒論並出在第一卷中尚德按在字疑衍

天行咽喉痛方二首 病源陰陽隔絕邪客於足少陰之絡毒氣上熏攻於咽喉故痛或生瘡也出第九卷中

深師療天行毒病或下不止咽喉痛黃連馬通湯方 小豆升一黃連去毛馬通汁三吳茱萸 右四味

以馬通汁令煮取一升盡服不差復作有效忌猪肉冷水出第十卷中

古今錄驗青木香湯療春夏忽喉咽痛而腫兼下痢方 青木香二兩黃連去毛白頭翁二兩 右三味切以

水五升煮取一升半分溫三服小兒若服之一服一合忌猪肉冷水出第三卷中

天行衄血方四首

病源天行衄血者五藏熱結所為心主於血邪熱中於手少陰之經客於足陽明之絡故衄血衄者血從

鼻出也出第九卷中 深師療天行毒病鼻衄是熱毒血下數升者方 勿療自差亦無所苦亦可取好松煙墨搏之以雞子白

尚德按去
疑當作者

宋本無共
字

尚德按凡
字下疑脫
方字

尚德按千
金石膏中
升後原取
如錫

和丸九如梧桐子大水下一服十九並無所忌

又黃土湯療鼻衄去五藏熱氣結所為或吐血者方

當歸 甘草 芎藭 黃芩 芍藥 各三

兩桂心

一生地黃一斤釜月下焦黃土如雞子一青竹皮兩

右九味切以水一斗三升煮竹皮減三升去滓內

諸藥煮取三升分四服忌海藻松菜生蔥

又方 黃芩兩四 右一味切以水五升煮取二升分三服亦療婦人漏下血

又療脈浮大鼻中燥如此必去血鼻衄方 灸兩臂中脈取止取臂脈法以鼻嗅臂點其鼻共所著處是

穴兩臂皆爾出第十

天行口瘡及口乾苦方四首

病源發汗下後表裏俱虛而毒氣未盡熏於上焦故喉口生瘡也

出第九

深師療天行熱盛口中生瘡酩酊煎丸

酩酊合蜜三 大青兩一

右三味合煎三沸稍稍傳口以差為度

又口瘡方 取蛇莓五升搗絞取汁稍稍飲之

並出第十

集驗療天行熱病口瘡升麻湯方

升麻二通草兩四 射干二 羚羊角三兩 芍藥三 生薑根切一

右六味

切以水七升煮取三升分為三服如人行五里更服

古今錄

又療天行熱病口苦下氣除熱喉中鳴石膏蜜煎方

石膏碎斤 蜜升一

右二味以水三升煮石膏取二

升乃內蜜復煎取一升去滓含如棗核許盡更含

千金同並出第二卷中

天行欬嗽方五首

病源熱邪氣客於肺上焦有熱其人必飲水水停心下則上乘於肺故上氣而欬也

並出第九

廣濟療天行壯熱欬嗽頭痛心悶前胡湯方

前胡 升麻各八 貝母 紫菀各六 石膏碎二 麥門冬各二

八分 杏仁三十粒 去竹葉切一 甘草二分

右九味切以水八升煮取二升五合絞去滓分溫三服相

去如人行六七里進一服不吐利差忌海藻松菜油膩猪油等

又療天行肺熱咳嗽喉有瘡地黃湯方 生地黃切一升麻 玄參 芍藥 柴胡 麥門冬去心各四

母六竹葉切一 白蜜合 右九味切以水九升煮取三升緩去滓內蜜再上火煎三沸含咽其汁勿停

中間不妨食不利忌蕪羹猪犬肉油膩

又療天行後乍寒乍熱昏昏不省覺脅下痛百節骨痛效不能下食兼口舌乾生瘡紫胡湯方 柴胡分

升麻分芍藥分黃芩分甘草分石膏分十二分 生麥門冬去心蔥白分半香豉六分生薑六分竹葉切一 右

十一味切以水九升煮取二升五合緩去滓分溫三服服別相去如人行六七里進一服不吐不利差

忌海藻松菜麴油膩並出第 生薑三兩去皮切 右一味以錫半斤和微

集驗療天行病上氣咳嗽多唾黏涎日夜不定生薑煎方 生薑三兩去皮切 右一味以錫半斤和微

煎令爛每日無間早晚少少含仍嚼薑滓一時嚥之

必救療天行病後因食酒麴肺中熱擁遂成欬不止方 桑白皮切 二桔梗切肥乾棗二十一麻黃六分

曹州葶藶子十分熱令紫色 右五味切先以水四升煮桑白皮等四味可取一升半去滓下葶藶子

膏更煎三五沸去滓分溫五服空心食後服或利勿怪忌猪肉油膩生冷果子等物

天行發斑方三首

病源夫熱病在表已發汗未解或吐下後熱毒氣不散煩躁謬語此為表虛裏實熱氣燥於外故身體發

斑如錦文凡發斑不可用發表藥令瘡開洩更增斑爛表虛故也出第九

肘後比歲有病天行發斑瘡頭面及身須臾周匝狀如火瘡皆戴白漿隨決隨生不即療劇者數日必死

療得差後瘡癰紫黯彌歲方減此惡毒之氣也世人云以建武中於南陽擊虜所得仍呼為虜瘡諸醫參

詳作療用之有效方 取好蜜通身摩瘡上亦以蜜煎升麻數數拭之亦佳

又方 以水濃煮升麻漬綿洗之苦酒漬煮彌佳但燥痛難忍也並出第

文仲陶氏云天行發斑瘡須臾遍身皆戴白漿此惡毒氣方 云永徽四年比瘡從西域東流于海內但

尚德按此
時後作此

夕臺和菓卷三

煮藥菜葉蒜釐啖之則止鮮羊血入口亦止初患急食之少飯下菜亦得

出第二卷中

天行發瘡豌豆痘瘡方一十三首

病源夫表虛裏實熱毒內熾攻於藏腑餘氣流於肌肉遂於皮膚毛孔之中結成此瘡重者匝遍其身狀如火瘡若根赤頭白則毒輕若色紫黑則毒重其瘡形如豌豆亦名豌豆瘡脈洪數者是其候也

出第九卷中

千金療人及六畜天行熱氣病豌豆瘡方 濃煮黍穰汁洗之若是穰穰則不差瘡若黑者搗蒜封之又

煮乾云薑汁洗之

又方 真波斯青黛大如棗水服之差

又熱病後發豌豆瘡方 黃連三兩去毛水二升煮取八合頓服之忌猪肉冷水

又若赤黑發如疥大者方 煎羊脂摩傳之

又方 青木香二兩水三升煮取一升頓服之效

又方 小豆屑和雞子白傳之

又方 以月布拭之

又療豌豆瘡初發覺欲作者方 煮大黃五兩服之

延年同

又療瘡出煩疼者木香湯方 青木香二丁香一兩薑一兩陸香一兩白礬一兩麝香三分

升半分再服熱盛者加一兩生犀角如無犀角以升麻代之如病輕去礬石大神效

又方 瘡上以芒硝和猪膽塗勿動痴落無痕仍卧黃土末上良此病小便澀有血者中壞瘡皆黑靨不

出膿死不瘡

又內發瘡盛方 醋四合大猪膽一具 右二味煎三沸一服一合日五服良驗

並出第十卷中

延年療天行壯熱頭病發瘡如豌豆遍身大青湯方 大青兩梔子枚犀角兩一升 右四味切以

水五升煮取二升分三服服之無所忌

古今錄驗水解散摩天行熱氣則生庖瘡疼痛解肌出汗方出聖麻黃一兩黃芩三分桂心二分

右四味搗篩煖水解服二方寸匕覆令出汗日再服差者減之忌海藻松菜生葱延年同出第二卷中一方有大黃三分

分單二

天行虛煩方二首

病源夫天行病陰氣少陽氣多故身熱而煩其毒氣在於心膈而煩者則令人悶而欲嘔若其人胃內有燥糞而煩者則謬語時繞臍痛腹滿皆當察其證候也出第九

文仲療天行表裏虛煩不可攻者但當與竹葉湯方竹葉二石膏一升麥門冬去心半升人參

肉二甘草兩二右六味切以水一斗煮取六升去滓內粳米一升煮米熟去之分五服嘔者與橘皮湯湯

方在上嘔哕篇中不愈者重作此宮泰數用甚效若傷寒後虛煩亦宜服此方是仲景方忌羊肉海藻

松菜鰓

又療虛煩不可攻方青竹茹半斤右一味以水四升煎至三升去滓分溫五服徐徐服之

天行狂語方三首

病源夫病熱盛則棄衣而走登高而歌或至不食數日踰垣上屋所上非其素時所能也病反能者皆陰

陽氣爭而外奔於陽四肢者諸陽之本也陽盛則四肢實實則能登高而歌熱盛於身故棄衣而走陽盛

故妄言罵詈不避親疎大熱遍身狂言而妄見妄聞也出第九

千金水道散療天行病煩熱如火狂言妄語欲走方白芷兩一甘遂二兩右二味搗篩以水服方寸匕

須臾令病人飲冷水腹滿則吐之小便當赤也一名濯腹湯此方療大急者出第十卷中

又五苓散主天行熱病但狂言煩躁不安精采言語與人不相主當方猪苓三分白朮三分澤瀉五分茯苓三分

桂心二分右五味搗篩為散水服方寸匕日三服多飲煖水汗出愈忌大醋生葱桃李雀肉等孫仲景

同出第

宋本無飲

尚德按干金道作丹白芷二兩

宋本無攻

尚德按病源名時華石膏為石膏一打石參三兩粳米半升

古今錄驗方天行壯熱狂言謬語五六日者方 雞子三枚芒硝七方寸井花水八杯 右三味合攪盡服之心

煩下則愈出第三卷中

天行熱毒攻手足方五首

病源熱毒氣從臍膈中出攻於手足則焮熱赤腫疼痛也人五藏六腑并榮輸皆出於手足指故此毒從肉而出攻於手足也出第九卷中

附後療天行病毒熱攻手足疼痛赤腫欲脫方 鹽豉及羊肉一斤以來 右三味以水一斗煮肉熟以

汁看冷煖漬手足日三度差同注

又方 細劉黃柏五斤許以水三斗煮漬之必效亦治攻陰腫

又方 作坎令深三尺大小容兩足燒坎中令熱以酒灌坎中著履踞坎上衣壅勿令氣泄日再作之

又方 煮羊桃葉汁漬之加少鹽尤好並出第二卷中

崔氏療天行熱毒攻手足方 豬蹄一具去毛劉碎合葱白一握切以水一斗煮熟去滓肉少鹽以漬之

附後出第一卷中

天行大小便不通脹滿及澀方四首

病源天行大小便不通此由脾胃有熱發汗太過則津液竭津液竭則胃乾燥結熱在內故大便不通又汗後津液虛少其人小腸有伏熱故小便不通出第九卷中

廣濟療天行熱氣惡寒頭痛壯熱大小便澀柴胡散方 柴胡八分茵陳十分青木香十分黃芩八分土瓜根十分白

鮮皮八分梔子仁十分大黃二分芒硝十二分 右九味搗為散平辰空肚以新汲水服五六錢七少時當

三兩行微利利後煮葱豉稀粥食之熱如未歇明屎更服四錢七熱歇停藥忌熱食猪大肉油膩等

又療天行惡寒壯熱頭痛大小便赤澀不下食飲柴胡湯方 柴胡七分茵陳七分大黃十二分升麻七枚梔子

四枚芒硝四分湯芍藥七枚黃芩十二分 右八味切以水四升先漬藥少時猛火煮取一升五合分溫三

尚德按時後云熱發及羊屎一井揭余熱以清之李時珍本草羊溺下亦引之

尚德按辰下同

服服別相去如人行六七里喫一服以快利為度第二服則利更不須服之忌熱食炙肉蒜粘食並出

近效主天行後兩脅脹滿方 熬鹽熨之如小便澀亦用鹽熨臍下如水腫以穀枝汁服愈大效

集驗療天行病腹脹滿大小便不通滑石湯方 滑石分十四 葶藶子令合紙上熬 大黃二分 右三味以

水一大升煎取四合頓服兼搗葱溲小腸乾即易之效肘後崔氏同無大黃

天行熱痢及諸痢方四首

病源此由熱氣在腸胃絞毒則下黃赤汁也又熱毒傷於腸胃故下濃血如魚腦或爛肉汁壯熱而腹絞

病此溫毒熱氣所為也並出第

深師療天行毒病酷熱下痢七物升麻湯方 升麻 當歸 黃連去毛 甘草 芍藥 桂心 黃柏各半兩

右藥切以水三升煮取一升頓服之忌海藻蒜菜豬肉冷水生葱等物

又天行諸下惡主黃連湯方 黃連三兩 黃柏二兩 當歸二兩 右三味以水六升煮取三升去滓內蜜一合

微火煎取二升半分三服良驗忌豬肉冷水並出第十四中一

范汪療天行熱毒下痢赤白久下膿血及下部毒氣當下細蟲如布絲縷大或長四五寸黑頭銳尾麝香

丸方 麝香一分 附子二分 雄黃 丹砂 乾薑各二 右五味各搗下篩訖復更合治之蜜和為丸如小

豆大飲下一丸老少半之效驗忌豬肉生血等出第三十

甲乙方療天行熱病差後痢膿血不止方 龍骨一兩 右一味搗研為末米飲下一錢不計時節日三服

佳

天行蠶瘡方八首

病源毒熱結在腹內穀氣衰毒氣盛三蟲動作食人五藏多令泄痢下部瘡痒若下脣內生瘡但欲寐者

此虫食下部也重者肛爛見五藏出第九

漆師療天行下部瘡爛方 烏梅二枚 大蒜二枚 屋塵取細者 右三味搗篩為散苦酒一升和調於

銅器中煎成丸作長挺內下部范汪同出十四卷中

范汪療人下部中瘡方 蒸棗取膏以水銀熟研丸之令相得長二三寸以綿薄裹內大孔中蟲出差

又療穀道中瘡方 以水中荇葉細搗綿裹內下部日三肘後

又療天行蠱蟲食下部生瘡雄黃兌散方 雄黃半兩 青箱子三兩 苦參 黃連各三兩 桃仁一兩半 去皮右

五味合搗篩綿裹如半棗核大內下部亦可米汁服方寸匕日三服忌豬肉冷水及麤炙肉蒜等物

又桂枝湯療天行蠱病方 桂心二兩 小藍二兩 右二味咬咀以水一斗煮取二升半內豬肝十兩去上膜

細研著湯中和令相得臨時小溫若毒悉在腹內盡服之在下部者三分藥中用一分竹筒內下部中

服藥一時間當下細蟲如髮大五六升小兒半作之忌生葱並出第三卷中

文仲姚氏療天行病蠱下部生瘡方 濃煮桃皮煎如糖以綿合導下部中若口中生瘡含之肘後范汪同出第二

中卷 甲乙方療天行病有蠱蟲蝕下部生瘡青箱子散方 青箱子一兩 瞿盧二兩 狼牙一兩 橘皮一兩 苦參三兩 右五

味搗篩為散米飲和服方寸匕日三服未差更服以差為度

又療天行痢膿血下部生蠱蟲黃連丸方 黃連三兩 蠟一兩 烏梅肉三兩 右三味鎔蠟和蜜為丸如

梧子大空心米飲下三十丸再服加至四十丸差忌豬肉冷水

天行陰陽易方二首

病源天行陰陽易病者是男子婦人天行病新差未平復而與交接得病者名為陰陽易也其男子病新

差未平復而婦人與之交接得病者名為陽易其婦人新病差未平復男子與之交接得病者名為陰易

若二男二女並不相易所以呼為易者陰陽相感動其毒度著於人如換易也其病狀身體熱衝胃頭重

不能舉眼中生眵四肢拘急小腹絞痛手足拳皆即死其亦有不即死者病苦小腹裏急熱上衝胃頭重

不欲舉百節解離經脈緩弱血氣虛骨弱端使噓噓吸吸氣力轉少著牀不能搖動起止仰人或歲月方
紀出第
卷中九

深師廢夫大得婦人陰易之病若因房室及諸虛勞少腹堅絞痛陰縮困篤欲死方 灸陰頭一百壯便

差可至三百壯皆愈良與此後生子如故無妨元注同

又療金湯易病方 取豚卵二枚溫令熱酒吞之則差出第
卷中十

天行虛羸方二首

病源夫人榮衛先虛後為邪其所中發汗吐下之後經絡損傷陰陽竭絕虛邪始散真氣尚少五藏猶虛

穀神未復無津液以營養故虛羸而生衆病焉中

崔氏療煩躁而渴不止惡寒仍熱者竹葉湯常用亦佳不徒療天行凡虛羸久病及瘧後習上瘧熱者

服之皆妙方 甘草二兩 棗十 半夏一兩 芍藥二兩 前胡一兩 黃芩一兩 小麥五兩 人參二兩 粳米一升 知母二兩 麥

門冬四兩 桔梗一升 薑四兩 竹葉一把 可用其葉 右十四味切以竹篩飲一斗五升者取五升分

三服若片天白而虛羸久病胃生痰熱亦同服之加黃者二兩除黃芩減知母一兩除桔梗用之大效

忌羊肉海菜松菜鰓山第一等即通也

千金補虛大兩後不足萬病虛勞同此方 取五歲以上七歲以下黃牛新生者乳一升以水四升煎取

一升如人服稍飲之不得過多十日不住服佳出第
卷中十

天行差後禁忌方二首

集驗云凡熱病新差及大病之後食猪肉及腸血肥魚油膩等必大下痢醫不能療也必至於死若食餅

餌漿黍飴脯醢炙棗栗諸果及堅實難消之物胃氣尚虛弱不能消化必更結熱適以藥下之則胃中虛

冷大利難禁不下必死下之復危皆難救也熱病之後多坐此死不可不慎也病新差但得食糜粥寧可

少食令飢慎勿飽不得他有所食難惡之勿與引日轉久可漸食羊肉糜若羹汁兔雉鹿肉慎不可食猪

也家本作

高德按奉

千金作

家本作

家本作

家本作

家本作

大肉也新差後當靜卧慎勿令人梳頭洗面非但體勞亦不可多言語用心使意勞凡此皆令勞後故督

郵顧子獻得病已差未健詣華勇視脈勇曰雖差尚虛未復陽氣不足勿為勞事餘勞尚可御內即死臨

死當吐舌數寸其妻聞其夫病除從百餘里來省之止宿交接中間三日發病舌出數寸而死病新差未

經百日氣未平復而以房室者略無不死也蓋正疾愈後六十日已能行射獵以房室則吐涎而死及熱

病房室名為陰陽易之病皆難療多死近者有士大夫小得傷寒發汗已十餘日能乘馬行來自謂平復

故以房室則小腹急痛手足拘拳而死

案師說天行病未復

滿三月日

差後必

第

差食

病差

天行勞復食復方六首

病源夫病新差血氣尚虛津液未復因即勞動更成病焉若言語思慮則勞傷於神梳頭澡洗則勞於力

未堪勞而強勞之則生熱熱氣既入經絡復為病者名曰勞復又病新差脾胃尚虛穀氣未復若食肥

肉魚膾餅棗栗之屬則未能消化停積在於腸胃使脹滿結實困更發熱復為病者名曰食復

廣濟療患天行熱氣差後勞發頭痛如初病者鼠矢湯方

鼓合 右五味切以水三升煮取一升七合去滓內鼠屎末分溫二服服別相去如人行六七里微汗

內消不利忌如藥法

又療患數日復勞發者枳實湯方 枳實三枚 梔子十四枚 蔥白一升 香豉半升 鼠屎二升 右五味以水一

斗煎取二升五合分溫三服服別相去如人行六七里進一服內消不利忌如藥法

深師竹葉湯療天行後虛熱勞食復四肢沈重或一卧一起氣力吸吸羸弱方 竹葉把小麥甘草

一石膏碎二兩 茯苓二兩半夏一升洗 前胡 知母 黃芩 人參略二生薑四兩大棗三升 右十二味

切以水一斗二升煮竹葉小麥減四升去滓內藥煮取三升分三服忌海藻菰菜醋物羊肉錫等物

備急療勞復方 以粉三升以煖飲和服厚覆取汗又以水和胡粉少許服之亦佳出第一卷中

延年葛根飲主熱病勞復身體痛天行壯熱煩悶葛根湯方 葛根兩一 蔥白一握半 豉半升 米一合 右四味先切

葛根以水九升煮取七升則內蔥白更煮取四升去葛及蔥滓訖則內豉及少許米煮取三沸並濾去

米等滓分四服常有汗出即差明旦又更作服忌豬肉蒜等九卷中

必效療天行勞復鼠矢湯方 雄鼠屎五枚兩頭共煮 豉一升 梔子一枚 枳實三枚中破 右四味以水五升煮取

二升四合分四服相去十里久若覺大便澀加大黃二兩出第一卷中

天行差後勞發方五首

許仁則云此病復發不但起動勞役或因飲食稍多或因言語過分或緣視聽不節或為動轉不常皆成

此復若復甚者乃至不救劇於初得病時不可以復發而云輕易勞復狀一如傷寒初有如此者宜合葛

白等七味飲服之漸覆取汗方 蔥白連鬚切一 乾薑切六 新豉一合 生薑切二 生麥門冬六合 乾地黃

合六 勞水八升此水以杓搗之十過 右藥用勞水煎之三分減二去滓分溫三服相去行八九里如覺欲汗漸

漸覆之康主傷寒忌無夷

又依前蔥白等七味飲服之得可但適寒溫將息以取安穩若不覺可宜合姜糖等五味飲子服之方

姜糖五兩 蔥白切一 豉心一升 粳米三合 雄鼠屎枚之 右藥以水七升先煮豉以上取四升汁去滓

內粳米屑煮米爛訖內鼠屎末攪調頓服覆被安卧取汗差

又凡天行病差後準常合漸健能行履遂過限不堪起動體氣虛羸每覺頭痛唇口乾乍寒乍熱發作有

時或雖能行動運轉然每作時節有前狀者名天行後不了了有此宜合地骨白皮等五味飲子白薇等

十味丸方細服之 地骨白皮 知母_{各三兩} 麥門冬_{五兩} 竹瀝_{一升} 白蜜_{三合} 右藥切知母以上和麥門

冬然後以水六升煮取二升去滓內竹瀝蜜攪調分溫三服服相去如人行十里久如覺虛不能空服

頓盡欲間食服亦佳兼主傷寒

又右服前地骨白皮等五味飲子不可雖可不能全退宜合白薇等十味丸方 白薇_{三兩} 知母_{四兩} 地骨皮

{三兩} 乾地黄{六兩} 麥門冬_{五兩} 甘草_{四兩} 蜀漆_{各三兩} 姜糖_{各三兩} 橘皮_{二兩} 人參_{三兩} 右藥細切合搗篩絹羅為散

蜜和丸如梧桐子大初服以飲下十五丸日再服稍加至三十丸服經三數日後自候腹中若覺熱則

食前服如不能以空飲下藥宜合烏梅等四味飲下前丸忌食菜海藻蘘蕪等

烏梅飲方 烏梅_{十枚} 姜糖_{各五兩} 生薑_{各五兩} 白蜜_合 右藥切以水六升煮三味取二升去滓內白蜜攪調細

細用下前丸多少冷暖以意斟酌縱不下丸但覺口乾渴則飲之

_{吳昇}

唐王燾先生外臺秘要方卷四目錄溫病及黃疸二十門

溫病論病源二首

辟溫方二十一首

斷溫令不相染方二首

溫病臧方四首

溫病渴方二首

溫病發斑方七首

溫病勞復方四首

諸黃方一十三首

急黃方六首

黃疸方一十三首

黃疸遍身方一十一首

癰黃方三首

黃疸小便不利及腹滿喘方二首

黃汗方三首

女勞疸方四首

黑疸方三首

酒疸方七首

穀疸方三首

許仁則療諸黃方七首

雜黃疸方三首

唐王焘先生外臺祕要方卷四

宋朝散大夫守光祿卿直祕閣判登陽閣院上護軍臣林億等上進

新安後學程行道敬通父訂梓

男仁聖 為賜 校布 父全 校

溫病論病源二首

病源經言春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冰寒此則四時正氣之序也冬時嚴寒萬類深藏君子固
密則不傷於寒觸冒之者乃為傷寒耳其傷於四時之氣皆能為病以傷寒為毒者以其最為殺厲之氣
中而即病者名為傷寒不即病者其寒毒藏於肌膚中至春變為溫病至夏變為暑病暑病者熱極入重
於溫也是以辛苦之人春夏多溫熱病者皆由冬時觸冒寒氣之所致以上與傷寒論同

凡病傷寒而成溫病者先夏至日者為病溫後夏至日者為病暑故曰冬三月早臥晚起必待日光使志
若伏若匿若有私意若已有得去寒就溫無泄皮膚使氣亟奪又因於寒欲如運樞故久傷於寒春必病
溫也又有冬時傷非節之暖名為冬溫之毒與傷寒大異也有病溫者乃天行之病耳其冬月溫暖之時
人感乘候之氣未遂發病至春或被積寒所折毒氣不得泄至天氣暄熱溫毒始發則肌肉斑爛也經曰
虛邪賊風避之有時恬淡虛無真氣從之精神四守病安從來故曰人清淨則肉腠閉拒雖有大風苛毒
弗之能害又云四時陰陽者萬物之根本也是以聖人春夏養陽秋冬養陰以從其根也從陰陽則生逆
之則死故曰精者身之本藏於精者春不病溫也有病溫汗出輒復熱而脈躁疾不為汗衰狂言不能食
病名為何曰病名陰陽交者死人所以汗出者皆生於穀穀生於精今邪氣交爭於骨肉之間而得汗
者是邪却而精勝也精勝則當能食而不復熱熱者邪氣也汗者精氣也今汗出而輒復熱者是邪勝也
不能食者精無裨也病而留者其壽可立而傾也汗出而脈尚躁盛者死今脈不與汗相應此不勝其病
也其死明矣狂言者是失志失志者死今見三死不見一生雖愈必死只膚熱其脈盛躁者病溫也其脈

姑方

工部附後

待後考
南與按
蜜千金作

尚德按以
下條例之
投字上疑
犯人以七
收四子

又治瘴氣竹茹湯方 青竹茹右一味以水四升煮取三升分三服

又辟溫病粉身散方 芎藭 白芷 藁本 右三味等分搗下篩內米粉中以粉塗身延年

又斷溫疫硃蜜丸方 白蜜和上等硃砂粉一兩常以太歲日平旦大小勿食向東方立人吞三七九如

麻子大勿令盡近之并吞赤小豆七枚投井泉水中終身勿忘此法

又治溫病不相染方 正旦吞麻子赤小豆各二十七枚又以二七枚投井中計緩延

又方 新布盛大豆一升內井中一宿出服七枚計緩用

又方 切松葉如粟米酒服方寸匕日三服辟五年溫

又方 常以七月七日合家含赤小豆向日吞二七枚

又方 常以七月七日男吞大豆七枚女吞小豆七枚

又方 神仙教人立春後有庚子日溫薑青蘆汁合家大小並服不限多少

又療溫氣蒜豉湯方 蒜五十子并皮研之豉心一升 右二味以三歲小兒小便二升合煮五六沸頓

服並出第
九卷中

千金翼老若神明白散方 白朮二兩桔梗兩附子二兩烏頭四兩細辛兩 右五味搗篩絳囊盛帶之

所居閭里皆無病若有得疫癘者溫酒服一方寸匕覆取汗得吐則差若經三四日者以三方寸匕內

五升水中煮令大沸分三服

又度瘴瘴方 麻黃五兩附子也白朮兩細辛 防己 乾薑 桂心 防風 烏頭也蜀椒也

右十二味搗篩為末密封貯之山中所在有瘴氣之處旦空腹服一錢匕覆取汗病重

稍加之並出第
十卷中

古今錄驗許山所撰千散散主辟溫疫瘴惡令不相染著氣方計緩作散千粒 附子也細辛分乾

薑分麻子分柏實分 右五味搗篩為散正旦舉家以井華水各服方寸匕服藥一日十年不病二

尚德隆
全無丹砂
止四味

日二十年不病三日三十年不病受師法但應三日服歲多病三日一服之附後胡合延年元王

又殺鬼丸去惡毒方 雄黃五兩 朱砂五兩 鬼白五兩 鬼背五兩 雌黃五兩 馬兜鈴五兩 鬼交五兩 虎骨五兩

阿魏五兩 甲香五兩 羚羊角五兩 桃白皮五兩 白膠香五兩 葛蒲五兩 殺羊角五兩 一皮 臘蜜五兩 石硫黃五兩 右十

七味搗篩十六味臘蜜和之丸如杏子將往辟溫處燒之候鬼去盡毒氣若大疫家可燒并帶行治也

二味不同出

延年秘錄辟溫方 正旦取東行桑根大如指長七寸以丹塗之懸著門戶上又令人帶之卷第十

辟溫不相染方二首

病源此病皆因歲時不和溫涼不節人感乘候之氣而生病則病氣轉相染易乃至滅門延及外人故須

預服藥及為法術以防之卷第十

千金斷溫疫主溫病轉相染著乃至滅門延及外人無收視者赤小豆丸方 赤小豆二兩 鬼白二兩 鬼背二兩

丹砂二兩 雄黃二兩 右五味末之以蜜和如小豆大服一丸可與病人同床傳衣也卷第九

延年主辟溫疫疾惡氣令不相染易豉湯方 豉五升 伏龍肝三兩 小兒小便三升 右三味用小便煎取

一升五合去滓平旦服之令人不着瘴疫天行有瘴之處宜朝服卷第十

溫病噦方四首

病源伏熱在胃令人胸滿胸滿則氣逆氣逆則噦若大下後胃中虛為亦令致噦也卷第十

小品茅根湯療溫病有熱飲水暴冷噦者方 茅根 葛根各切 右二味以水四升煮取二升稍溫飲

之噦止則停

又療溫病熱未除重被暴寒寒毒入胃熱結不散噦者方 單煮梓皮稍稍飲之佳溫病稍熱冷令

結胃中熱入腎中愛壯熱大噦者服梓皮溫噦得止也夫腎中有熱者病差後足心皮裏刺脫去頭熱

失落是其證也

入茅根橘皮湯療春夏天行傷寒溫病干胃冷變哕方 白茅根切一升橘皮三兩桂心二兩葛根二兩右四味

切以水六升煮取三升分溫服三合數連服之盡復合哕止乃停耳微有熱減桂一兩文仲古今錄驗

古今錄驗療溫病有熱飲水暴冷哕枇杷葉飲子方 枇杷葉批去毛茅根各半右二味切以水四升煮

取二升稍稍飲之哕止則停出第三卷中

溫病渴方二首

病源熱氣入腎藏腎藏惡燥熱氣盛則腎燥腎燥則渴引飲也出第十卷中

深師療溫毒病及吐下後有餘熱渴為藥湯神方 芍藥五分黃連四分甘草二分黃芩二兩桂心二兩枳實二分

右六味切以水五升煮取三升分三服一日令盡出第十卷中

古今錄驗知母解肌湯療溫熱病頭痛骨肉煩疼口燥心悶者或是夏月天行毒外寒內熱者或已下之

餘熱未盡者或熱病自得痢有虛熱煩渴者方 麻黃二兩知母三兩葛根三兩石膏三兩甘草二兩右五味

切以水七升煮取三升分為三服若已下及自得下虛熱未歇者除麻黃加知母葛根病熱未除因導

泄者可除麻黃加白薇人參各二兩則止出第二卷中

溫病發斑方七首

病源夫人冬月觸胃寒毒者至春始發病初在表或已發汗吐下而表證未罷毒氣不散故發斑瘡又

冬月天時溫暖人感乖候之氣未即發病至春又被積寒所折毒氣不得泄至夏遇熱其春寒解冬溫毒

始發出於肌膚斑爛隱癰如錦文也出第十卷中

肘後療溫毒發斑大疫難救黑骨方 生地黃伴好鼓升右二味以豬膏二斤合煎之煎五六沸令三

分減一絞去滓末雄黃屑香如大豆者內中攪和盡服之毒便從皮中出則愈出第二卷中

小品葛根橘皮湯療冬溫未即病至春被積寒所折不得發至夏得熱其春寒解冬溫毒始發出肌中斑

爛隱癰如錦文壯熱而欲心悶嘔但吐清汁宜服此湯則靜方 葛根二兩橘皮二兩杏仁二兩麻黃二兩

外臺 溫病渴方二首 溫病發斑方七首

知母^二黃芩^二甘草^二雨

右七味切以水七升煮取三升分溫三服嘔問吐當先定便且消息結今

六卷中

刪繁瘧肺臍藏熱暑氣斑點香鼓湯方 香鼓^一刺蔥^一切^四石膏^八梔子^仁生薑^八大青^二升麻^三

芒硝^三右八味切以水六升煮七味取二升五合去滓然後下芒硝分三服^{卷第十}

備急瘧溫毒發斑赤斑者五死一生黑斑者十死一生大疫難救黑奴丸方 麻黃^三去^三附^三大黃^二芒硝^一

黃芩^二釜底墨^一雨 龜尾墨^一雨 屋梁上塵^一雨 右七味搗末用蜜和如彈子大新汲水五合研一

丸服之若渴但與水須臾當寒寒訖便汗則解日移五丈不覺更服一丸此療六日胸中常大熱口噤

名壞病醫所不療服此丸多差^{胡合小品同一名水解丸入一方加小}

古今錄驗黃連橘皮湯療冬溫未即病至春被積寒所折不得發至夏得熱其春寒解冬溫毒始發出肌

中斑爛隱疹如錦文而欬心悶嘔吐清汁眼赤口瘡下部亦生瘡已自得下刺宜服此方 黃連^四雨 橘

皮^二杏仁^二雨 枳實^一雨 麻黃^二雨 葛根^二雨 厚朴^一雨 甘草^一雨

分三服令盡且消息下當先止 右八味切以水八升煮取三升

又漏蘆橘皮湯療冬溫未即病至春被積寒所折不得發至夏熱其春寒解冬溫毒始發出肌中斑爛隱

疹如錦文而欬心悶嘔吐清汁眼赤口瘡下部亦生瘡方 漏蘆 橘皮 甘遂 麻黃 杏仁^{去皮}黃

芩^二雨 右六味切以水九升煮取三升分四服得下為佳下後餘外證未除更服葛根橘皮湯方在

前小品方^{一方有知母枳實白薇升麻大黃甘草為十二味出後三卷中}

又發斑瘡方 黃連^{切三}雨 右一味以水二升煮取八合頓服之忌豬肉冷水

溫病勞復方四首

病源溫病勞復謂病新差津液未復血氣尚虛因勞動早更生於熱熱氣還入經絡復成病也

又凡得溫毒病新差脾胃尚虛穀氣未復若食犬猪羊肉并腸血及肥魚炙脂膩必大下痢下痢則不可

尚論雜錄
千金作泉

通按能藥
即能藥
尚能藥
時口能
大按能
時口能
中已疑

復散又食餅餌多食寒涼諸生果消物則不能消化停積在於腸胃便脹滿結實大小便不通因更發
執復成病也非但難食抗而洗滌勞事等皆須慎之如桃李生惡生菜花肉等與在所忌並出第十卷中

千金論曰凡熱病新差及大病之後食諸肉及腸血肥魚炙膩必大下痢醫所不能療也必至於死若食
餅餌菜果飽脹足踰裏裏諸果及堅實難消之物胃氣尚虛弱不能消化必更結熱適以藥下之則胃虛
冷大利難禁不下之必死下之復危皆難救也熱病及大病之後多坐此死不可不慎也病新差後但得
食糜粥寧可少食令饑慎勿飽不得他有所食難思之勿與引日轉久可漸食羊肉糜若羹汁雉兔鹿肉
不可食猪狗肉也新差後當靜臥慎勿早起勿令人梳頭澡洗非但體勞亦不可多語言用心使意勞凡
此皆令人勞復有人得病已差而未健詣華視脉曰雖差尚虛未復腸氣不足勿為勞事餘勞尚可御
內則死臨死當吐舌數寸其妻聞其夫病除從百餘里來省之止宿交接中間三日發病舌出數寸而死
病新差未滿百日氣力未平復而以房室者略無不死及熱病房室名陰陽易之病皆難療多死古今錄驗集

又療重病新差早起勞及飲食多致復欲死方 燒蠶甲末服方寸匕忌菹菜肘後集驗文仲備急同出第十卷中

深師療溫病差愈食復病麻黃散方 麻黃去十分大黃分十五附子一分厚朴二分苦參分六石膏分六碎烏

頭分右七味搗篩以酒若米汁和服方寸匕日三夜二服出第十卷中

古今錄驗療熱病復麻子湯吳正服方麻子升一豉升一壯鼠屎一枚右三味以水五升煮取二升半分溫三

服立愈試之有神驗謝後

又大黃丸方 大黃二兩芒硝五分巴豆五枚去硝石三分桂心一分乾薑二分右五味搗篩四味

別搗巴豆令如泥合和以蜜更搗二千杵丸如梧子一丸湯服之但熱在膈上當吐在膈下當利豫作

粥如服他吐下丸去服藥兩食頃不吐下以熱飲動之若不得吐下可更服一丸半能藥壯人可二丸

此藥優於他下藥丸故宜大小下多冷病解之若有倉綿挺如指蜜和一丸塗挺頭旦內瘡中暍出之

不差更作溫病不得大便服之得下佳宿食不消亦服之飛尸遁尸漿服半九日一應須臾止心腹脹滿痛服一丸瘧者依經日先痛勿食清晨服一丸丁壯人服二丸得吐下忍飢過發時乃食婦人產後血結中奔走起上下或絕產無子或月經不調面目青黃服半丸小兒淋瀝寒熱臃腫大腹不欲食食不生肌三四歲者如麻子服一丸日一六七歲兒服二丸比三十日心腹諸病差兒小半之愈大良忌野猪肉麋生葱卷出第三

諸黃方一十三首

病源黃病者一身盡發熱面色同黃七八日後結熱在裏有血當下之如狔肝狀其人小腹滿急若其人眼睛強及鼻骨疼兩膊及項強腰背急則是患黃大便澀但令得小便秘則不慮死不用大便秘多則心腹脹不好此由寒濕在表則執畜於脾胃脾理不開發熱與宿穀相搏鬱處不得消則大小便不通故身體面目皆覺黃色凡黃候其寸口近掌無脉口鼻氣冷並不可療之必死卷第十

仲景傷寒論諸黃諸黃發前主之方 豬膏兩斤亂髮七枚 石二味以髮膏中煎之髮消盡研絞去膏

細滓分二服病從小便去也明後備急入仲千金古今錄驗家傳再病胃中乾腹下便差神驗出第十四卷中

刪繁瘡天行毒熱通貫臍腹沈鼓骨髓之間或為黃疸黑疸赤疸白疸穀疸馬黃等疾喘息須臾而絕爪

常散方 瓜蒂枚二七 赤小豆枚二七 秫米粒二七 右三味搗篩為散取如大豆粒吹於兩鼻之中甚良不

差間日復服之千金范王

又方 瓜蒂枚二七 右一味以水一升煮取五合作一服

又方 鹽升 右一味紙裏清濕燒之取通赤內三升水中攪令調手巾漉鹿為一服已前二方服訖並

吐出黃汁

崔氏療黃實家無藥者可依此方 取柳枝三大升以水一斗煮取濃汁搗半升一服令盡

又療黃兼主心腹方 蔓菁子一大合 右一味搗碎熟研以水一升更和研漉取汁可得一大盞頓服

尚德按一
要略作三
尚德按千
金注引之
鼓作伏而
作不

之少頃自當轉利或亦自吐腹中便寬亦或得汗便愈備急文仲深師同

延年秘錄療黃瓜蒂湯方 瓜蒂一赤小豆九丁香二七 右三味搗末以水一升煮取四合澄清分

為兩度滴入兩鼻中卷第十

救急療三十六種黃方 取雞子一顆并殼燒作灰研酢一合大溫之搥和頓服身體眼暗極黃者不過

三顆鼻中蟲出神效

久療諸黃關黃眼闇及大角赤黑黃先搗手足內黃患渴疸黃眼赤黃腎黃小便不通氣急心悶五色黃

瓜蒂散方 丁香 瓜蒂 赤小豆各十 右三味為細搗篩取煖水一雞子許和服大神驗並出第十卷中廣

同

必效療一切黃將九處得其父遠使得黃服此極效茵陳湯及九方 茵陳四大黃三黃芩三梔子三兩

右四味切以水五升煮取三升分為三服空肚服之不從搗篩蜜和為丸飲服二十九稍稍加至二十

五九量病與之重者作湯勝服丸日一服忌羊肉酒麴熱物等以差為限小便黃色及身黃者並主之

久療諸黃眼已黃亦差瓜蒂散方 丁香一分赤小豆一分瓜蒂一分方加秫米一分 右三味搗末溫水食前

頓服使盡則當利并吐黃水不差更服並出第十卷中

千金療黃疸大黃丸方 大黃二葶藶三 右二味搗篩為末蜜和為丸如梧子大未食服十九日三服

病差便止

又大黃丸方 大黃二黃連三黃芩 黃柏各一麴衣五 右五味搗篩為末蜜和丸如梧子大食前服

三九日三服不知可至五九忌豬肉冷水並出第十卷中

急黃方六首

病源脾胃有熱穀氣鬱塞因為熱毒所加故卒然發黃心滿氣喘命在頃刻故云急黃也有得病即身體面目發黃者有初不知是黃死後乃身面黃者其候得病但發熱心戰者是急黃也並出第十卷中

尚德隆等
黃等
黃疑當作

通按精神
息疑是神
尚德隆等
神急謂神
清躁急也

廣濟療急黃身如金色瓜蒂散方 赤小豆二七 丁香二七 黍米二七 瓜蒂二七 麝香 薑陸香等分
布二寸 燒為灰 右七味搗篩為散飲服一錢匕則下黃水其黃則定忌生冷熱麝粘食陳臭等味出第三

中卷
必效療急黃疸內等黃大黃湯方 大黃三兩 芒硝二兩 右二味以水二升生漬大黃一宿平旦絞汁一

升半內芒硝攪服須臾當快利差卷中第一

延年秘錄療急黃心下堅硬渴欲得水咽氣息喘麝眼黃但有一候相當即須宜服此瓜蒂散吐則差方

瓜蒂二小 赤小豆二 右二味搗篩為散年大人煖漿水五小合和散一服滿一方寸匕一炊久當吐

不吐更服五分匕水亦減之若輕病直吹鼻中兩黑豆粒大亦得當鼻中黃水出即歇并宜灸心厭骨

下一寸名巨闕灸五七炷以來初小作炷在後漸大仍不得大如梧子

吐訖及灸了後即渴仍服麥門冬飲子方 麥門冬四兩 栝蒌三兩 竹葉升 茯苓四兩 升麻二兩 生薑根一 甘草

一兩 右七味切以水七升煎取二升五合絞去滓分溫三服服別相去如人行八九里久服此飲渴

即止卷中第十

千金療急黃熱氣骨蒸兩目赤脉地黃汁湯方 生地黃汁合 大黃分 芒硝兩 右三味合和服五

合日二服以利為度

近效療急黃方 取蔓菁子油一盞蠅鼠之臨時無油則以蔓菁子搗取汁水和之喫亦得候顏色黃或

精神急則是此病神急謂神 黃疸方十三首

病源黃疸之病此由酒食過度藏腑不和水穀相并積於脾胃復為風濕所搏凝結不散熱氣鬱蒸故食

已如饑令身體面目爪甲及小便盡黃而欲安臥若身脉多赤多黑多青皆見者必寒熱身痛面色微黃

蓋垢黃爪甲上黃此黃疸也疸而渴者其病難療疸而不渴者其病可療發於陰部其人必嘔發於陽部

尚德按十
金麻黃三

尚德按
類云
磨小麥為
之一名黃
衣

其人振寒而發卷第十

仲景傷寒論黃麻黃醇酒湯主之方麻黃一升右一味美清酒五升煮取二升半去滓頭服盡

古今方云傷寒氣出表發黃疸宜汗之則愈冬月用酒春宜用水煮之良小品古今類驗

又黃疸茵陳蒿五苓散主之方茵陳蒿末右二味和先食白飯和方寸匕服之日三師

范注

又五苓散利小便治黃疸方猪苓三分白朮三分茯苓三分澤瀉五分桂心分右五味博篩和合白飯和服

一方寸匕日三多飲煖水以助藥勢汗出便愈十金麻黃方

肘後療黃疸方燒亂髮服一方寸匕日三秘鹽酒飲並得出第一卷中

范汪療黃疸散方取瓠子白瓢及子熱令黃擣為末服半錢匕日一服十日愈用瓠子數數有吐者當

先詳之出第五十卷中

集驗療黃疸百藥不差者方鹽頭一枚煮熟以薑薑味之并隨多少飲汁出第二卷中

千金療黃疸方取生小麥茵陳絞取汁飲六七合晝夜三四飲三四日便愈無小麥茵陳麥苗亦得范

汪云用小麥勝也備急文仲集驗

千金翼療黃疸目黃不除瓜丁散方瓜丁細末如大豆許內鼻中令病人深吸取入鼻中黃汁出

又黃蒸湯方基和黃黃蒸升麥麵升諸屎并右三味以水五升煮一宿煮取三升絞去滓頓服一升

覆取汗必效同出第十八卷中

崔氏療黃疸年六十以上方茅根把豬肉右二味合作羹盡一服愈當灸臍上下兩邊各一寸半

一百壯手魚際白肉側各灸隨年壯諸急

又療黃疸方苦胡蘆煎如大薤許右一物以童子小便二合浸之三兩食頃取兩酸漿汁分內兩

鼻孔中餘節候與上方同比來常用乃勝諸急

近效療黃疸瓜蒂散方 瓜蒂^{二七}赤小豆^七生林米^{二七}丁香^{二七} 右四味搗篩重者取如大豆二

枚各著一枚鼻孔中痛縮鼻須臾鼻中漉清黃水或從口中出并餘則愈病輕者如一小豆則可一與

不盡間日復頻用效李嵩用之立驗俗人或使人以竹筒極力吹鼻中無不死者慎之

又療男子女人黃疸病醫療不愈身目悉黃食飲不消胃中脹熱生黃衣在胃中有乾屎使病爾方

成煎豬脂一小升溫熱頻盡服之日三燥屎下去乃愈

黃疸遍身方一十一首

廣濟療黃疸遍身面悉黃小便如濃梔子汁茵陳丸方 茵陳^四黃芩^三枳實^二兩 大黃^三 右四味搗

篩蜜丸空腹以米飲服如梧子二十九日二服漸加至二十五丸微利為度忌熟麪蒜蕎麥粘食陳臭

物^雨一方^雨第一^雨卷^雨三

肘後療黃疸者一身面目悉黃如橘柚暴得熱外以冷迫之熱因留胃中生黃衣熱重上所致方 豬脂

升 右一味成煎者溫令熱盡服之日三燥屎當下下則稍愈便止

小品療黃疸身目皆黃皮膚麤塵出三物茵陳蒿湯方 茵陳^四蒿^二梔子^二石膏^二斤千金方加大黃^三

右三味以水八升煮取二升半去滓以猛火燒石膏令正赤投湯中沸定取清汁適寒溫服一升自腹

令汗出周身遍以溫粉粉之則愈若不汗更服一升汗出乃愈也

集驗療黃疸身體面目皆黃大黃散方 大黃^四黃連^四黃芩^四 右三味搗篩為散先食服方寸匕日

三服亦可為丸服

刪繁療黃疸者通身並黃茵陳湯方 茵陳^四柴胡^四升麻^三龍膽草^二黃芩^二 大黃^三 右六味切

以水九升煮取三升分三服若身體藏去大黃加梔子仁五六兩生地黃切一升

千金翼論曰凡遇天行熱病多必內癢著黃但用瓜丁散內鼻中令黃汁出乃愈即於後不復恐病黃矣

常須用心警候病人四肢身面微似有黃氣則須用瓜丁散不得令散漫失候必大危矣特已酒麴犯者

死

凡人無故忽然振寒便發黃皮膚黃胸膈出小便赤少大便時閉氣力無異食飲不妨已服諸湯餘熱不除久黃者苦參散方 苦參_{兩一}黃連_{兩一}葶藶子_{兩一}赤白帶_{兩一}黃芩_{兩一}黃柏_{兩一}大黃_{兩一}右七味搗為散

飲服方寸匕當大吐者日一服不吐日二亦得下服藥五日知可消息不知更服忌豬肉冷水_{驗古今錄}

小品同出第

崔氏療黃疸身體面目盡黃茵陳湯太醫校尉史脫方 茵陳_{兩三}黃連_{兩二}黃芩_{兩三}梔子_{兩四}大黃_{兩一}甘

草_{兩一}人參_{兩一}右七味切以水一斗煮取三升分三服_{全同出}

延年祕錄梔子湯療遍身黃如橘心肋滿急方 梔子_{兩一}黃芩_{兩三}柴胡_{兩四}升麻_{兩三}龍膽草_{兩三}大黃_{兩三}枳

實_{兩三}芒硝_{兩二}右八味切以水九升煮取二升八合去滓分溫三服相去四五里進一服_{出第十}

必放黃疸身眼皆如金色但諸黃皆主之方 取東引桃根細切如筋若釵股以下者一握取時勿令見

風及婦人并雞犬等見之以水一大升煎取稠一小升適寒溫空腹頓服服後三五日其黃離離如薄

雲散唯眼最後差百日方平復身黃散後可時時飲一盞清酒則眼中易散不則散遲忌食麪諸魚等

肉此方是徐之才家祕方其姪珍惠說密用_{出第一}

近效療發黃身而眼悉黃如金色小便濃如煮黃柏汁者泉醫不能療良驗茵陳湯方 茵陳_{兩四}黃芩_{兩二}

梔子_{兩三}升麻_{兩三}大黃_{兩三}龍膽草_{兩二}枳實_{兩二}柴胡_{兩四}右八味切以水八升煮取二升七合分溫三服

若身絕羸加生地黃一升梔子加至七兩七升大黃如氣力不羸依前者大黃取驗忌如法不差更作以

差為限不過三四劑差隔三五日一劑_{驗心錄同李良}

療黃方三首

病源陽氣伏陰氣盛熱毒加之故但身面色黃頭痛而不發熱名為瘡黃也_{出第十}

廣濟療瘡黃身而眼俱黃小便如鼓汁色茵陳散方 茵陳_{兩四}白鮮皮_{兩三}枳實_{兩四}黃芩_{兩三}梔子_{兩四}芍藥_{兩三}

尚德按要
略大黃四
兩又按要
略取三升

尚德按要
字下疑脫
出字
尚德按要
不渴若
作谷若
尚德按要
略云以下
出入水中
浴水從汗

青木香三柴胡三枳實三黃連三紫雪三瓜根三大青三大黃三升右十四味搗篩為散煮茅根

飲待冷平旦空腹以茅根飲服五錢匕一服少間當一兩行微利利後煮稀蔥豉粥食之利多以意漸

減常取微洩利通一兩行為度差止忌豬肉冷水魚蒜粘膩及諸熱食卷中第一

必效療瘡黃眼晴黃汗染衣涕吐黃方好黃蒸升大右一味每夜以水二大升浸煖煖令熱勿令沸

銅器中平旦絞取汁半升飲之餘汁須臾則飲冬日微煖服夏冷飲每夜則浸依前服之亦得每夜小

便中浸白帛片取色退為驗兩方並極效忌麝羊肉豬肉

又療瘡黃汗染衣涕唾黃者方取蔓菁子搗細末平旦以井花水和一大匙服之日再漸加至兩匙以

知為度每夜小便裏浸少許帛各書記日色漸退白則差不過服五升以來必差李閩州傳極效附後

張文仲張師同
出第一卷中

黃疸小便不利及腹滿喘方二首

仲景傷寒論黃家腹滿小便不利而赤身汗出者表和裏實也宜下之大黃黃柏皮梔子硝石湯方大

黃細黃柏四梔子十五硝石四右四味切以水六升煮三物得二升半去滓內硝石更煎取一升先

食頓服盡師范汪並同

又黃疸小便色不變欲自利腹滿而喘者不可除其熱熱除必噦噦者小半夏湯主之方半夏五兩生

薑八兩右二味以水六升煮取一升半去滓分溫三服忌羊肉鰾范汪同並第

黃汗方三首

病源黃汗之為病身體洪腫發熱汗出而渴狀如風水汗染衣色正黃如柏汁其脉自沉此由脾胃有熱

汗出而入水中若浴水入汗孔得之卷中

仲景傷寒論師曰黃汗為病身體腫發熱汗出而渴狀如風水汗沾衣色正黃如柏汁脉自沉也問曰從

何得之師曰以汗出水入汗孔水從外入而得之宜黃耆為藥桂心酒湯主之方黃耆五兩芍藥三兩桂心

孔入得之
各書方桂
酒湯
大按代酒
要略作代
若酒

尚後按要
略各桂枝
又按要略
甘草黃書
各二兩

尚後按千
金無此文

三 右三味切以苦酒一升水七升和煮取三升去滓溫服一升正當心煩也至六七日稍稍自除其

心煩不止者以苦酒阻故一作阻一方用美酒醱代酒忘生惡補急張文仲千金古今錄

又凡黃汗之病兩脰自冷假令發熱此屬臍節食已則汗出又身常夜臥盜汗出者此勞氣也若汗出即

發熱者久久身必甲錯也發熱不止者必生惡瘡也若身重汗出已輒輕者久久必身瞢瞢則胸中痛又

從腰以上必汗出下無汗腰髀弛痛如蟲在皮中狀劇者不能食身疼重煩躁小便不利者名曰黃汗桂

枝湯加黃耆五兩主之方 桂心 芍藥 甘草 生薑 大棗 黃耆 右六味切以水八升

微火煎取三升去滓溫服一升覆取微汗須臾間不汗者食稀熱粥一升餘以助湯力若不汗者更服

湯也忌海藻菰菜生蔥古今錄范汪同

療黃疸身腫發熱汗出而渴狀如風水汗出著衣皆黃黃汗吳藍湯方 吳藍 芍藥 麥門冬 桂 桑白

皮 漢防己 白鮮皮 山梔子 右七味各細切以水二升煎取八合去滓空腹分二服未效

再合服此方未

女勞疸方四首

病源女勞疸之狀身目皆黃發熱惡寒少腹滿急小便難因大勞大熱而房室房室畢入水所致也出第

仲景傷寒論黃家曰晡發熱而反惡寒此為女勞得之膀胱急小腹滿身體盡黃額上反黑足下熱因作

黑瘰大便必黑腹臌脹滿如水狀大便黑澹此女勞之病非水也腹滿者難療硝石礬石散主之方

硝石 礬石 右二味等分搗絹篩以大麥粥汁和服方寸匕日三重衣覆取汗病隨大小便去

小便正黃大便正黑也大麥則須是無皮麥者千金方云硝石二分熱令燥礬石一分熱令燥故注之

千金翼療黃疸之為病曰晡所發熱惡寒小腹急體黃額黑大便秘澹泄足下熱此為女勞也腹滿者難

治後小品崔氏文仲千金方

女勞疸方四首 吳藍芍藥

女勞疸方四首 吳藍芍藥

療方 滑石五兩 石膏五兩 右二味為散以大麥粥汁服方寸匕日三小便極利則差仲並同出第

卷十八

近鼓女勞疸黃家日晡發熱而反惡寒此為女勞得之膀胱急小腹滿身體盡黃額上反黑足下熱因作黑疸其大便必黑腹臃脹滿如水狀大便黑澹此女勞之病非水也療與黑疸同數疸食則眩心忪悸鬱不安久久發黃為穀疸並以前茵陳湯主之方在遍身黃部中

必效女勞之黃氣短聲沈者宜服此方 取婦女月經布和血衣燒作灰以酒空腹服方寸匕日再服不過三日必差

黑疸方三首

病源黑疸之狀若小腹滿身體盡黃額上反黑足下熱大便黑是也夫黃疸酒疸女勞疸久久變成黑疸

尚應按中 卷疑當作 卷中

出第十 肝後療黃疸變成黑疸者多死急治之方 取土瓜根汁服一小升平旦服至食時病從小便去則愈不

忌先須量病人氣力不得多服力衰則起不得千金并藥文仲集給在氏刪

深師療黑疸身體及大便正黑赤小豆茯苓湯方 赤小豆三十枚 茯苓六錢 瓜蒂銕 雄黃二錢 甘草半兩 女萎

銕 右六味切以水三升煮小豆茯苓取八合汁搏後四藥為散取前汁調半錢已適寒溫服之須臾

當吐吐則愈一方云療久黃疸忌大醋海藻菰菜千金方名赤苓最千金

千金翼茵陳丸主黑疸身體臃腫小便澀體重方 茯苓四分 茵陳兩 枳實五分 白朮五分 半夏三兩 甘遂

一分 杏仁三分 去蜀椒二升 當歸二兩 葶藶子四分 大黃二兩 乾薑四兩 右十二味搏篩蜜和丸如梧子

空肚飲服三九日三服忌羊肉鵝酥桃李雀肉等卷中

酒疸方七首

病源夫虛癆之人若飲酒多進穀少者則胃内生熱因大醉當風入水則身自發黃心中懊痛足脛滿小

尚應按中 卷疑當作 卷中 與此不同 白入此黃 不止妙

尚德安操
要略作燥
尚德安操
四枚

尚德按金分兩異此不同

便黃面發赤斑若下之久久變為黑疸目青面黑心中如吸蒜齏狀大便秘黑皮膚抓之不仁其脉浮弱故知之酒疸心中熱欲嘔者當吐之即愈小便不利其候當心中熱足下熱是其證明也若腹滿欲吐鼻

躁其脉浮者先吐之沉弦者先下之

出第十卷中

仲景傷寒論酒暈者心中懊懣或熱痛梔子

出第十
二卷中

仲景傷寒論酒痺者心中懊懣或熱痛梔子枳實鼓大黃湯主之方

梔子一枚枳實五枚香豉一升大黃一兩

右四味切以水六升煮取二升去滓溫服七合日三服朔後十四卷中
 肘後療酒疸者心中懊痛足脛滿小便黃飲酒面發赤斑黃黑由大醉當風入水所致黃耆散方
 黃耆

第十卷中

木蘭皮

右二味為散酒服方寸匕日三服仲同

深師酒疸艾湯方

生艾葉把一麻黃去節大黃分六大豆升

右四味切清酒五升煮取二升分爲三服第

卷三十

千金蔞陳湯主黃疸酒疸酒癖身體面目盡黃方太醫校尉史脫虛

茵陳兩 大黃方一兩 梔子枚一

用三兩一方
 一兩一方
 人參
 用半兩一方
 一兩一方

黃連用二兩
甘草吳

猪肉冷水海藻松菜

—

又夫人病痘者或無熱靜言了了腹滿欲吐酒疸心中熱欲嘔吐之即愈方

取千金翼苦參散吐良在

上通身黃部中七味者是也

又肉瘻飲少小便多白如泔色得之從酒寒水石散方

寒水石 五分
白石脂 五分
枯萸 五分
蔓繇子 酒漬 知母

分三桂心分三

右六味搗篩麥粥服五分匕日三服五日知忌生葱

師古
等今
正錄
同驗
滿

古今錄驗療酒癖及飲黃疸散方

芫花
椒目
各等

右二味搗下篩為散平旦服一錢匕老少半服

之藥攻兩脅則下便愈間一日復服使小減如前又與之使盡根源

一不
十師
七同
卷出
中第

穀疸方三首

病源穀疸之狀食畢頭眩心忪怫鬱不安而發黃由失饑大傷胃氣衝重所致陽明病脉遲食難用飽飢

尚德按而
勢就當作
而疽

則發煩頭眩者必小便難此欲為穀疸雖下之其腹必滿以其脉遲故也出第十卷中

范汪療穀疸茵陳湯方 茵陳四兩切以水一斗煮取六升以汁煎大黃二兩梔子七枚得二升分為三

服黃從小便去病出立愈附後同出第

集驗療勞疸穀疸丸方 若參三卷中龍膽草一右二味下篩牛膽汁和丸先食以麥粥飲服如梔子大五

丸日三不知稍增千金同出

刪繁療勞疸穀疸苦參丸方勞疸者因勞為名也穀疸者因食而勞故曰穀疸若參三卷中龍膽草二梔子仁三右三味搗篩

為散若病甚取猪膽和為丸如梔子大一服五九日三四服以飲汁下之

許仁則療諸黃方七首

許仁則療急黃病此病始得與前天行病不多異五六日但加身體黃甚者淡音夷藥液也下同淚汗唾小便如

柏色眼白睛正黃其更重狀與天行病候最重者無別如至此因自須依前故天行最重半夏等分十味

湯救之若未至是者宜依後法急黃狀始得大頻天行病經三兩日宜合麻黃等五味湯服之發汗以洩

黃勢方 麻黃三兩乾薑五兩石膏五兩生薑六兩茵陳二兩右藥切以水八升煮取二升七合去滓分溫三服

服相去十里久服訖當欲汗則覆被微取汗以散之

又依前麻黃等五味湯服之取汗汗出後未歇經三五日又合梔子等五味湯以取利方 梔子二十枚柴

胡三兩黃芩三兩茵陳三兩芒硝一兩右藥切以水八升煮四味取二升六合去滓內芒硝攪令消分溫三服

如人行十里久更服之效

又依前梔子等五味湯服之取利利後病勢不歇經六七日又合秦艽牛乳二味湯服之方 秦艽六兩牛

乳二升右藥切秦艽以牛乳煮之可三分減一去滓帶煖頓服令盡極驗文中西如後同

又依前秦艽等二味湯藥服後不覺病退漸加因篤勢如前天行最重狀則不可更服諸冷物冷物在心

唯是瘡速宜同前天行用半夏等十味湯以救之亦可合瓜蒂等三味散吹鼻乳中并與之服方 瓜蒂

按丁香赤小豆按

右藥搗篩末取如大豆分吹兩鼻孔中須臾當出黃水正如煮柏汁及出黃蟲

亦可新汲水和一方寸匕與患人服或利或吐利所出亦如煮黃柏汁天行用此療亦與崔氏同

又論云此病俗間亦有單煮瓜蒂汁灌鼻孔中者亦有單服生麻油者

又療黃疸病此病與前急黃不同自外狀與平常無別但舉體正黃甚者眼色如柏涕涎洩小便及汗悉

如柏汁食消多於尋常稍覺瘦悴之力此病不甚殺人亦有經年累歲不療而差者此由飲酒多亦是積

虛熱所致黃疸初得稍覺心中煩熱滿身黃色眼白睛黃覺如此者宜合白鮮皮等七味湯以洩之黃連

十味丸以壓之白鮮皮乾薑黃芩鬱金豉梔子芒硝右藥切以水八升煮取二升

半去滓內芒硝分溫三服服相去如人行二十里久更服此湯當得利利後將息一二日則合後黃連

等十味丸服之

又黃連丸方黃連黃芩苦參沙參乾地黄乾葛梔子仁麥門冬地骨白皮茯苓

芩五兩右十味搗篩為末蜜和為丸以米飲下初服十九日三服稍稍加至三十九丸如梧子大黃疸亦

有單服豬脂得差者忌豬肉冷水大酢薑蔥等物眼昇

雜黃疸方三首

千金濕疸之為病始得之一身盡疼發熱面色黃黑七八日後壯熱熱在裏有血當下之如狔肝狀其

小腹滿者急下之亦一身盡黃日黃腹滿小便不利礬石散方礬石五兩滑石五兩右二味為散大麥粥

汁服方寸匕日三服當先食服便利如血者當汗出差深師古今錄驗並


古今錄驗九疸秦王散方胃痺食多喜飲吐子仁心痺煩心中熱當根之腎痺其人唇乾尋梔子脾痺

溺亦出少心惕惕若恐主之肺痺飲少小便多之秦椒汗脈滯主古痺渴而數便主之石鍾乳肉痺其人小便

病所在加二分持合下篩飲服五分匕日三稍加至方寸匕忌桃李雀肉等

膏痺飲少小便多秦椒散方 秦椒汗一分瓜蒂分 石二味搗下篩水服方寸匕日三服保師千金同出卷二十七

外臺秘要卷四中



W 3467 W

1915

v. 2-4